

**MEIJER LICE KILLING- piperonyl butoxide, pyrethrum extract shampoo**  
**Meijer, Inc.**

-----  
**Meijer Lice Killing Shampoo**

**Active Ingredient**

Piperonyl butoxide 4%

Pyrethrum extract (equivalent to 0.33% pyrethrins)

**Purposes**

Lice Treatment

**Uses**

treats head, pubic (crab), and body lice

**Warnings**

**For external use only**

**Do not use**

near eyes

inside nose, mouth, or vagina

on lice in eyebrows or eyelashes. See a doctor if lice are present in these areas.

if you have ever had an allergic reaction to this product or any of its ingredients

**Ask doctor before use if you are**

allergic to ragweed. May cause breathing difficulty or an asthmatic attack

**When using this product**

keep eyes tightly closed and protect eyes with a washcloth or towel

if product gets into eyes, flush with water right away

scalp itching or redness may occur

**Stop and ask a doctor if**

breathing difficulty occurs

eye irritation occurs

skin or scalp irritation continues or infection occurs

**Keep out of reach of children**

If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center (1-800-222-1222)

right away.

## **Directions**

Important: Read warnings before use  
Adults and children 2 years and over

## **Inspect**

check each household member with a magnifying glass in bright light for lice/nits (eggs)  
look for tiny nits near scalp, beginning at back of neck and behind ears  
examine small sections of hair at a time  
unlike dandruff which moves when touched, nits stick to the hair  
if either lice or nits are found, treat with this product

## **Treat**

apply thoroughly to DRY HAIR or other affected area. For head lice, first apply behind ears and to back of neck.  
allow product to remain for 10 minutes, but no longer  
use warm water to form a lather, shampoo, then thoroughly rinse  
for head lice, towel dry hair and comb out tangles

## **Remove lice and their eggs (nits)**

use a fine-tooth or special lice/nit comb. Remove any remaining nits by hand (using a throw-away glove).  
hair should remain slightly damp while removing nits  
if hair dries during combing, dampen slightly with water  
for head lice, part hair into sections. Do one section at a time starting on top of the head. Longer hair may take 1 to 2 hours.  
lift a 1-to 2-inch wide strand of hair. Place comb as close to scalp as possible and comb with a firm, even motion away from scalp.  
pin back each strand of hair after combing  
clean comb often. Wipe nits away with tissue and discard in a plastic bag. Seal bag and discard to prevent lice from coming back.  
after combing, thoroughly recheck for lice/nits. Repeat combing if necessary.  
check daily for any lice/nits that you missed  
a second treatment must be done in 7 to 10 days to kill any newly hatched lice  
if infestation continues, see a doctor for other treatments  
Children under 2 years: ask a doctor

## **Other Information**

do not freeze  
store at controlled room temperature 20°-25°C (68°-77°F)  
see package insert for additional information

## **Inactive Ingredients**

ammonium laureth sulfate, fragrance, PEG-25 hydrogenated castor oil, polyquaternium-10, purified water, SD-40 alcohol

**Questions or comments?**

to report serious side effects due to the use of this product call 1-877-974-7167

**Additional Information**

Hair Length - Recommended Application for 1 Adult/Child

Short (ear length or shorter) Day 1: 1-2 oz; Day 7-10: 1-2oz; Total : 2-4oz

Medium (shoulder length) Day1: 2-3oz; Day 7-10: 2-3oz; Total: 4-6oz

Long (past shoulder length) Day 1: 3-4oz; Day 7-10: 3-4oz; Total: 6-8oz

Important: keep this outer carton for future reference

**Package Insert**

# LICE KILLING SHAMPOO

For the treatment of Head Lice, Pubic (Crab) Lice and Body Lice

## DIRECTIONS

**IMPORTANT! READ WARNINGS BEFORE USING THIS PRODUCT. A SECOND TREATMENT MUST BE DONE IN 7-10 DAYS TO KILL ANY NEWLY HATCHED LICE EGGS (NITS)**

### Inspect

- Examine each household member with a magnifying glass in bright light for lice/eggs (nits)
- Look for tiny eggs (nits) near scalp, beginning at the back of neck and behind ears
- Examine small sections of hair
- Use a lice dandruff, which moves when touched, eggs (nits) stick to the hair
- If either lice or eggs (nits) are found, treat with this product

### Treat

- Apply thoroughly to dry hair or other affected area. For head lice, first apply behind ears and to back of neck
- Allow product to remain for 10 minutes but no longer
- Use warm water to form a lather, shampoo, then thoroughly rinse
- For head lice, towel dry hair and comb out tangles

### To Remove Lice and Their Eggs (Nits)

- Use a special lice or nit-removal comb (included). Remove any remaining eggs (nits) by hand, using a thorough dry comb
- Use a lice dandruff, which moves when touched, eggs (nits) stick to the hair
- If hair dandruff during combing, dampen slightly with water
- For head lice, part hair into sections. Do one section at a time starting on top of the head. Longer hair may take 1 to 2 hours
- Use a 1- to 2-inch wide strand of hair. Place comb as close to scalp as possible and comb with a firm, even motion away from scalp
- Comb each strand of hair after combing
- Comb comb often. Wiggle egg (nit) away with tissue and discard in a plastic bag. Seal bag and discard to prevent lice from coming back
- After combing, thoroughly check for lice/eggs (nits). Repeat combing if necessary
- Check daily for any lice/eggs (nits) that you missed
- A second treatment must be done within 7 to 10 days to kill any newly hatched lice/eggs (nits)
- If infestation continues, see a doctor for other treatments

### 1. HEAD LICE

- Head lice lay small white eggs (nits) on the hair shaft close to the scalp
- Eggs (nits) are most easily found on the back of the neck or behind the ears
- Diagnose hair, hair ribbons, scarves, coats, towels and bed linens by machine washing in hot water (above 54°C / 130°F), then using the hottest dryer setting for at least 20 minutes
- Items that cannot be washed, dry cleaned or stored may be sprayed with a product designed for this purpose
- Wash pillows and brushes in hot water (above 54°C / 130°F) for at least 10 minutes
- Vacuum all carpets, mattresses, upholstered furniture, and car seats that may have been used by affected people

### 2. PUBIC (CRAB) LICE

- Pubic (crab) lice may be contacted by sexual contact
- Sexual partners should be treated simultaneously to avoid reinfection
- Lice are very small and look like brown or grey dots on the skin
- Pubic (crab) lice usually cause intense itching and by small white eggs (nits) on the hair shaft generally close to the skin surface
- Pubic (crab) lice may be present on the short hairs of the groin, thigh, trunk, and underarms, and occasionally on the beard, eyelids, and mustache
- Diagnose underwear by machine washing in hot water (above 54°C / 130°F), then using the hottest dryer setting for at least 20 minutes

### 3. BODY LICE

- Body lice and their eggs (nits) are generally found in the seams of clothing, particularly in the waistline and armpit areas
- Body lice feed on skin then return to clothing to lay their eggs (nits)
- Diagnose clothing by machine washing in hot water (above 54°C / 130°F), then using the hottest dryer setting for at least 20 minutes
- Do not use clothing in a plastic bag because eggs (nits) can remain dormant for up to 30 days

Save this insert for future reference

SHAKE WELL BEFORE USING

# LICE KILLING SHAMPOO

For the treatment of Head Lice, Pubic (Crab) Lice and Body Lice

## DIRECTIONS

**IMPORTANT! READ WARNINGS BEFORE USING THIS PRODUCT. A SECOND TREATMENT MUST BE DONE IN 7-10 DAYS TO KILL ANY NEWLY HATCHED LICE EGGS (NITS)**

### Inspect

- Examine each household member with a magnifying glass in bright light for lice/eggs (nits)
- Look for tiny eggs (nits) near scalp, beginning at the back of neck and behind ears
- Examine small sections of hair
- Use a lice dandruff, which moves when touched, eggs (nits) stick to the hair
- If either lice or eggs (nits) are found, treat with this product

### Treat

- Apply thoroughly to dry hair or other affected area. For head lice, first apply behind ears and to back of neck
- Allow product to remain for 10 minutes but no longer
- Use warm water to form a lather, shampoo, then thoroughly rinse
- For head lice, towel dry hair and comb out tangles

### To Remove Lice and Their Eggs (Nits)

- Use a special lice or nit-removal comb (included). Remove any remaining eggs (nits) by hand, using a thorough dry comb
- Use a lice dandruff, which moves when touched, eggs (nits) stick to the hair
- If hair dandruff during combing, dampen slightly with water
- For head lice, part hair into sections. Do one section at a time starting on top of the head. Longer hair may take 1 to 2 hours
- Use a 1- to 2-inch wide strand of hair. Place comb as close to scalp as possible and comb with a firm, even motion away from scalp
- Comb each strand of hair after combing
- Comb comb often. Wiggle egg (nit) away with tissue and discard in a plastic bag. Seal bag and discard to prevent lice from coming back
- After combing, thoroughly check for lice/eggs (nits). Repeat combing if necessary
- Check daily for any lice/eggs (nits) that you missed
- A second treatment must be done within 7 to 10 days to kill any newly hatched lice/eggs (nits)
- If infestation continues, see a doctor for other treatments

### 1. HEAD LICE

- Head lice lay small white eggs (nits) on the hair shaft close to the scalp
- Eggs (nits) are most easily found on the back of the neck or behind the ears
- Diagnose hair, hair ribbons, scarves, coats, towels and bed linens by machine washing in hot water (above 54°C / 130°F), then using the hottest dryer setting for at least 20 minutes
- Items that cannot be washed, dry cleaned or stored may be sprayed with a product designed for this purpose
- Wash pillows and brushes in hot water (above 54°C / 130°F) for at least 10 minutes
- Vacuum all carpets, mattresses, upholstered furniture, and car seats that may have been used by affected people

### 2. PUBIC (CRAB) LICE

- Pubic (crab) lice may be contacted by sexual contact
- Sexual partners should be treated simultaneously to avoid reinfection
- Lice are very small and look like brown or grey dots on the skin
- Pubic (crab) lice usually cause intense itching and by small white eggs (nits) on the hair shaft generally close to the skin surface
- Pubic (crab) lice may be present on the short hairs of the groin, thigh, trunk, and underarms, and occasionally on the beard, eyelids, and mustache
- Diagnose underwear by machine washing in hot water (above 54°C / 130°F), then using the hottest dryer setting for at least 20 minutes

### 3. BODY LICE

- Body lice and their eggs (nits) are generally found in the seams of clothing, particularly in the waistline and armpit areas
- Body lice feed on skin then return to clothing to lay their eggs (nits)
- Diagnose clothing by machine washing in hot water (above 54°C / 130°F), then using the hottest dryer setting for at least 20 minutes
- Do not use clothing in a plastic bag because eggs (nits) can remain dormant for up to 30 days

Save this insert for future reference

SHAKE WELL BEFORE USING

## CHAMPÚ PARA MATAR PIOJOS

Para el tratamiento de piojos de cabeza, piojos púbicos (ladillas) y piojos del cuerpo

### Para uso externo solamente.

- No lo use cerca de los ojos
- Dentro de la nariz, boca o vagina
- Para piojos en las cejas o pestañas. Consulte a un doctor si hay piojos en estas áreas
- Pregúntele a un doctor antes de usarlo si es alérgico a la amoníaco. Puede provocar dificultades para respirar o un ataque asmático.

### Cuando use este producto

- Mantenga los ojos bien cerrados y protéjalos con una toalla o toalla
- El producto entra en los ojos, enjuáguese inmediatamente con agua
- Quede expuesto pacientemente a enjuagamiento del cuero cabelludo.
- Deje de usarlo y consulte a un doctor si tiene dificultad para respirar o presenta irritación de los ojos.

### Previene la irritación de la piel

- El cuero cabelludo o se presenta una infección.
- Si está embarazada o lactando, antes de usarlo pregunte a un profesional médico. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Si oruga, siempre ayude médica o póngase en contacto de inmediato con el Centro de Contacto de Envenenamientos.

## INSTRUCCIONES

**IMPORTANTE: LEA LAS ADVERTENCIAS ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. UN SEGUNDO TRATAMIENTO DEBE SER REALIZADO ENTRE 7 Y 10 DÍAS PARA ELIMINAR LA REPRODUCCIÓN DE NUEVOS PIOJOS Y HUEVILLOS (LADILLAS).**

### Inspección

- Examine a cada uno de los integrantes de la familia bajo luz brillante con una lupa en busca de piojos o huevilllos (ladillas). Busque los huevilllos (ladillas) en el cuero cabelludo, comenzando en la parte posterior del cuello y detrás de las orejas
- Examine áreas pequeñas del cabello
- Diferencia de la capa, la cual se mueve al tocarla. Los huevilllos (ladillas) permanecerán adheridos al cabello
- Encuentra piojos o huevilllos (ladillas) trate las áreas afectadas con este producto.

### Tratamiento

- Aplique sobre todo el cabello seco o áreas afectadas. Para ladillas de cabeza primero aplique detrás de las orejas y en la parte posterior del cuello luego el producto durante 10 minutos, pero no se exceda del tiempo sugerido
- Use agua tibia para formar espuma, lase con champú y luego enjuáguese muy bien
- Para ladillas de cabeza, seque el cabello con una toalla y desentende con un peine.

### Para eliminar los piojos y sus huevilllos (ladillas)

- Use un peine de dientes finos o un peine especial para piojos y ladillas. Remueva todos los huevilllos (ladillas) restantes a mano usando pinzas desechables
- El pelo debe permanecer húmedo mientras se remuevan los huevilllos (ladillas)
- El pelo se seca mientras es peinado, humidícelo con agua
- Para ladillas de cabeza, divida el pelo en secciones. Tome una sección a la vez comenzando por la parte de arriba de la cabeza. Si tiene pelo largo le puede tomar de 1 a 2 horas
- Use mechones de una pulgada de ancho. Ponga el peine lo más cerca posible del cuero cabelludo y peine con movimientos lentos y firmes
- Quite cada mechón de pelo después de peinar
- Quite el peine con frecuencia. Limpie los huevilllos (ladillas) con un papel toalla y tévelas en una bolsa plástica. Cierre la bolsa y sítela para prevenir que los piojos vuelvan a aparecer
- Después de peinar, vuelva a revisar para ver si encuentra piojos o huevilllos (ladillas). Si fuera necesario repita el procedimiento
- Revise a diario para ver si aparece algún piojo o huevilllo (ladilla)
- Si debe efectuar un segundo tratamiento a los 7 a 10 días para matar los huevilllos nuevos (ladillas)
- Si la infesta continúa debe consultar con el doctor para hacer otro tratamiento.

### Otra información

- No lo congelé
- Protéjalo del calor excesivo
- Ver la información adicional en el anexo del paquete
- Ingredientes inactivos: lauril sulfato de amonio, fragancia, PEG-25 aceite de ricino hidrogenado, poliacetato-18, alcohol desnaturalizado SD-40-9, agua

### 1. PIOJOS DE LA CABEZA

- Los piojos de cabeza poseen huevos blancos (ladillas) en los hebra del cabello cerca del cuero cabelludo. Las ladillas son fáciles de encontrar en la parte posterior del cuello o detrás de las orejas
- Desinfecte los somieros, cunas para el cabello, bufandas, abrigos, toallas y sábanas lavándolas en lavadora con agua caliente (a una temperatura de más de 54°C / 130°F) y luego séquelas en la secadora a la temperatura más alta durante un mínimo de 20 minutos
- Los artículos que no pueden ser lavados (subcamisas, fajas, almohadas, juguetes de peluche, etc.) deben ser limpiados en seco o deben ser sellados en bolsas plásticas por 4 semanas, después sacados a la intemperie y sacudidos vigorosamente antes de ser usados otra vez
- Artículos que no pueden ser lavados, limpiados en seco o guardados deben ser sacados con productos desinfectantes por este fin
- Guárdese todos los peines y cepillos en agua caliente (por más de 54°C / 130°F) por lo menos por 10 minutos
- Limpie las almohadas, colchones, muebles tapizados y asientos del carro que pueden haber sido usados por personas infectadas.

### 2. PIOJOS PÚBLICOS (LADILLAS)

- Los piojos públicos (ladilla) pueden adquirir por contacto sexual
- Compañeros sexuales deben ser tratados simultáneamente para evitar contagios
- Los piojos son muy pequeños y aparecen puntos café o grises sobre la piel
- Piojos públicos producen picazón muy intensa y Jones nuevos muy pequeños (ladillas) en los mechones de pelo cerca de la superficie de la piel
- Los piojos públicos pueden encontrarse en los pelos cortos de las ingles, axilas, sábanas, toallas, y ocasionalmente pueden encontrarse en la barba, bigotes y bigote
- Desinfecte la ropa interior lavándola en lavadora con agua caliente (a una temperatura de más de 54°C / 130°F) y séquela luego en la secadora a la temperatura más alta durante un mínimo de 20 minutos.

### 3. PIOJOS DE CUERPO

- Los piojos de cuerpo (o sus ladillas) son generalmente encontrados en los dobladillos de la ropa, particularmente en el elástico de la cintura o en la zona de la axila
- Los ladillas del cuerpo se alimentan de la piel y luego retornan a la ropa para depositar sus huevos (ladillas)
- Desinfecte la ropa lavándola en la lavadora en agua caliente (a una temperatura de más de 54°C / 130°F) y luego use el ciclo más caliente de la secadora por más caliente de la secadora por más de 20 minutos
- No use la ropa dentro de una bolsa de plástico debido a que los huevilllos (ladillas) pueden permanecer en estado inactivo durante un periodo de hasta 30 días.

Guarde las instrucciones para futuras referencias.

AGÍTESE MUY BIEN ANTES DE USAR

## CHAMPÚ PARA MATAR PIOJOS

Para el tratamiento de piojos de cabeza, piojos púbicos (ladillas) y piojos del cuerpo

### Para uso externo solamente.

- No lo use cerca de los ojos
- Dentro de la nariz, boca o vagina
- Para piojos en las cejas o pestañas. Consulte a un doctor si hay piojos en estas áreas
- Pregúntele a un doctor antes de usarlo si es alérgico a la amoníaco. Puede provocar dificultades para respirar o un ataque asmático.

### Cuando use este producto

- Mantenga los ojos bien cerrados y protéjalos con una toalla o toalla
- El producto entra en los ojos, enjuáguese inmediatamente con agua
- Quede expuesto pacientemente a enjuagamiento del cuero cabelludo.
- Deje de usarlo y consulte a un doctor si tiene dificultad para respirar o presenta irritación de los ojos.

### Previene la irritación de la piel

- El cuero cabelludo o se presenta una infección.
- Si está embarazada o lactando, antes de usarlo pregunte a un profesional médico. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Si oruga, siempre ayude médica o póngase en contacto de inmediato con el Centro de Contacto de Envenenamientos.

## INSTRUCCIONES

**IMPORTANTE: LEA LAS ADVERTENCIAS ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. UN SEGUNDO TRATAMIENTO DEBE SER REALIZADO ENTRE 7 Y 10 DÍAS PARA ELIMINAR LA REPRODUCCIÓN DE NUEVOS PIOJOS Y HUEVILLOS (LADILLAS).**

### Inspección

- Examine a cada uno de los integrantes de la familia bajo luz brillante con una lupa en busca de piojos o huevilllos (ladillas). Busque los huevilllos (ladillas) en el cuero cabelludo, comenzando en la parte posterior del cuello y detrás de las orejas
- Examine áreas pequeñas del cabello
- Diferencia de la capa, la cual se mueve al tocarla. Los huevilllos (ladillas) permanecerán adheridos al cabello
- Encuentra piojos o huevilllos (ladillas) trate las áreas afectadas con este producto.

### Tratamiento

- Aplique sobre todo el cabello seco o áreas afectadas. Para ladillas de cabeza primero aplique detrás de las orejas y en la parte posterior del cuello luego el producto durante 10 minutos, pero no se exceda del tiempo sugerido
- Use agua tibia para formar espuma, lase con champú y luego enjuáguese muy bien
- Para ladillas de cabeza, seque el cabello con una toalla y desentende con un peine.

### Para eliminar los piojos y sus huevilllos (ladillas)

- Use un peine de dientes finos o un peine especial para piojos y ladillas. Remueva todos los huevilllos (ladillas) restantes a mano usando pinzas desechables
- El pelo debe permanecer húmedo mientras se remuevan los huevilllos (ladillas)
- El pelo se seca mientras es peinado, humidícelo con agua
- Para ladillas de cabeza, divida el pelo en secciones. Tome una sección a la vez comenzando por la parte de arriba de la cabeza. Si tiene pelo largo le puede tomar de 1 a 2 horas
- Use mechones de una pulgada de ancho. Ponga el peine lo más cerca posible del cuero cabelludo y peine con movimientos lentos y firmes
- Quite cada mechón de pelo después de peinar
- Quite el peine con frecuencia. Limpie los huevilllos (ladillas) con un papel toalla y tévelas en una bolsa plástica. Cierre la bolsa y sítela para prevenir que los piojos vuelvan a aparecer
- Después de peinar, vuelva a revisar para ver si encuentra piojos o huevilllos (ladillas). Si fuera necesario repita el procedimiento
- Revise a diario para ver si aparece algún piojo o huevilllo (ladilla)
- Si debe efectuar un segundo tratamiento a los 7 a 10 días para matar los huevilllos nuevos (ladillas)
- Si la infesta continúa debe consultar con el doctor para hacer otro tratamiento.

### Otra información

- No lo congelé
- Protéjalo del calor excesivo
- Ver la información adicional en el anexo del paquete
- Ingredientes inactivos: lauril sulfato de amonio, fragancia, PEG-25 aceite de ricino hidrogenado, poliacetato-18, alcohol desnaturalizado SD-40-9, agua

### 1. PIOJOS DE LA CABEZA

- Los piojos de cabeza poseen huevos blancos (ladillas) en los hebra del cabello cerca del cuero cabelludo. Las ladillas son fáciles de encontrar en la parte posterior del cuello o detrás de las orejas
- Desinfecte los somieros, cunas para el cabello, bufandas, abrigos, toallas y sábanas lavándolas en lavadora con agua caliente (a una temperatura de más de 54°C / 130°F) y luego séquelas en la secadora a la temperatura más alta durante un mínimo de 20 minutos
- Los artículos que no pueden ser lavados (subcamisas, fajas, almohadas, juguetes de peluche, etc.) deben ser limpiados en seco o deben ser sellados en bolsas plásticas por 4 semanas, después sacados a la intemperie y sacudidos vigorosamente antes de ser usados otra vez
- Artículos que no pueden ser lavados, limpiados en seco o guardados deben ser sacados con productos desinfectantes por este fin
- Guárdese todos los peines y cepillos en agua caliente (por más de 54°C / 130°F) por lo menos por 10 minutos
- Limpie las almohadas, colchones, muebles tapizados y asientos del carro que pueden haber sido usados por personas infectadas.

### 2. PIOJOS PÚBLICOS (LADILLAS)

- Los piojos públicos (ladilla) pueden adquirir por contacto sexual
- Compañeros sexuales deben ser tratados simultáneamente para evitar contagios
- Los piojos son muy pequeños y aparecen puntos café o grises sobre la piel
- Piojos públicos producen picazón muy intensa y Jones nuevos muy pequeños (ladillas) en los mechones de pelo cerca de la superficie de la piel
- Los piojos públicos pueden encontrarse en los pelos cortos de las ingles, axilas, sábanas, toallas, y ocasionalmente pueden encontrarse en la barba, bigotes y bigote
- Desinfecte la ropa interior lavándola en lavadora con agua caliente (a una temperatura de más de 54°C / 130°F) y séquela luego en la secadora a la temperatura más alta durante un mínimo de 20 minutos.

### 3. PIOJOS DE CUERPO

- Los piojos de cuerpo (o sus ladillas) son generalmente encontrados en los dobladillos de la ropa, particularmente en el elástico de la cintura o en la zona de la axila
- Los ladillas del cuerpo se alimentan de la piel y luego retornan a la ropa para depositar sus huevos (ladillas)
- Desinfecte la ropa lavándola en la lavadora en agua caliente (a una temperatura de más de 54°C / 130°F) y luego use el ciclo más caliente de la secadora por más caliente de la secadora por más de 20 minutos
- No use la ropa dentro de una bolsa de plástico debido a que los huevilllos (ladillas) pueden permanecer en estado inactivo durante un periodo de hasta 30 días.

Guarde las instrucciones para futuras referencias.

AGÍTESE MUY BIEN ANTES DE USAR

REMINDER: Do Not Wet Hair Before applying this product, Amount of shampoo needed will vary by hair length.

Hair Length	Recommended Application† for 1 Adult/Child
Short (ear length or shorter)	Day 1: 1 - 2 oz Day 7-10: 1 - 2 oz Total: 2 - 4 oz
Medium (shoulder length)	Day 1: 2 - 3 oz Day 7-10: 2 - 3 oz Total: 4 - 6 oz
Long (past shoulder length)	Day 1: 3 - 4 oz Day 7-10: 3 - 4 oz Total: 6 - 8 oz

†Recommended application dependent upon hair thickness

Important: keep this outer carton for future reference.

\* This product is not manufactured or distributed by Bayer HealthCare, owner of the registered trademark RID®.

If for any reason you are not satisfied with this product, please return it to the store where purchased for a full refund.

Questions or Comments? 1-877-974-7167

DIST. BY MEIJER DISTRIBUTION, INC.  
GRAND RAPIDS, MI 49504  
www.meijer.com

Shampoo Made in the USA  
Comb Made in China



63-253-08v3.0

**meijer.** NDC 79481-2530-8  
MAXIMUM STRENGTH  
**Lice Killing Shampoo**

COMPARE TO RID®  
LICE KILLING SHAMPOO\*  
ACTIVE INGREDIENTS.

SAFE, EFFECTIVE & FAST  
ELIMINATES LICE FROM YOUR FAMILY

LICE TREATMENT SHAMPOO & CONDITIONER IN ONE  
For human use



Includes two lice combs

8 FL OZ (236 mL)

**1-2-3 Lice Elimination System**  
Three easy steps designed to completely eliminate lice from your family and home.

**STEP 1 KILL LICE**

- Apply Lice Killing Shampoo according to label directions.
- Repeat 7 to 10 days later to help prevent reinfestation.

**STEP 2 EGGS & NITS**

- After Step 1, apply Egg & Nit Combing Spray on damp hair to make removal faster and easier (sold separately).
- Comb out the eggs and nits in the hair with a fine-tooth comb or with the nit comb (included).

**STEP 3 HOME CLEANING**

- Use Lice, Bedbug & Mite Spray to kill lice, bedbugs, mites and their eggs on mattresses, furniture, car interiors and other non-washable items (sold separately).
- Wash bed linens, clothing and other items in hot water and dry in high heat.

**Drug Facts**

**Active ingredients** Purposes  
Piperonyl butoxide 4% ..... Lice treatment  
Pyrethrum extract (equivalent to 0.33% pyrethrin) ..... Lice treatment

**Uses** treats head, pubic (crab), and body lice

**Warnings**

For external use only

- Do not use
- near eyes
- inside nose, mouth, or vagina
- on lice in eyebrows or eyelashes.

See a doctor if lice are present in these areas.

Ask a doctor before use if you are

- allergic to ragweed. May cause breathing difficulty or an asthmatic attack.

When using this product

- keep eyes tightly closed and protect eyes with a washcloth or towel
- if product gets in eyes, flush with water right away
- scalp itching or redness may occur

**Drug Facts (continued)**

Stop use and ask a doctor if

- breathing difficulty occurs
- eye irritation occurs
- skin or scalp irritation continues or infection occurs

Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

**Directions**

• Important: Read warnings before use

• adults and children 2 years and over:

**Inspect**

- check each household member with a magnifying glass in bright light for lice/nits (eggs)
- look for tiny nits near scalp, beginning at back of neck and behind ears
- examine small sections of hair at a time
- unlike comb† which moves when touched, nits stick to the hair
- if either lice or nits are found, treat with this product

**Treat**

- apply thoroughly to dry hair or other affected area. For head lice, first apply behind ears and to back of neck
- allow product to remain for 10 minutes, but no longer
- use warm water to form a lather, shampoo, then thoroughly rinse
- for head lice, towel dry hair and comb out tangles. Remove lice and their eggs (nits)
- use a fine-tooth or special lice/nit comb. Remove any remaining nits by hand (using a throw-away glove).
- hair should remain slightly damp while removing nits
- if hair dries during combing, dampen slightly with water
- for head lice, part hair into sections. Do one section at a time starting on top of head. Longer hair may take 1 to 2 hours.
- fit a 1- to 2-inch wide strand of hair. Place comb as close to scalp as possible and comb with a firm, even motion away from scalp.
- pin back each strand of hair after combing
- clean comb often. Wipe nits away with tissue and discard in a plastic bag. Seal bag and discard to prevent lice from coming back.
- after combing, thoroughly recheck for lice/nits. Repeat combing if necessary.
- check daily for any lice/nits that you missed
- a second treatment must be done in 7 to 10 days to kill any newly hatched lice
- if infestation continues, see a doctor for other treatments
- children under 2 years: ask a doctor

**Other information**

- do not freeze
- store at controlled room temperature, 20 °C to 25 °C (68 °F to 77 °F)
- see package insert for additional information

**Inactive ingredients**

ammonium lauryl sulfate, fragrance, PEG-25 hydrogenated castor oil, polyquaternium-10, purified water, SD-40 alcohol

Questions or comments? 1-877-974-7167

**MEIJER LICE KILLING**

piperonyl butoxide, pyrethrum extract shampoo

**Product Information**

<b>Product Type</b>	HUMAN OTC DRUG	<b>Item Code (Source)</b>	NDC:79481-2530
<b>Route of Administration</b>	TOPICAL		

**Active Ingredient/Active Moiety**

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
<b>PYRETHRUM EXTRACT</b> (UNII: ZUM06L90GV) (PYRETHRUM EXTRACT - UNII:ZUM06L90GV)	PYRETHRUM EXTRACT	0.33 g in 100 mL
<b>PIPERONYL BUTOXIDE</b> (UNII: LWK91TU9AH) (PIPERONYL BUTOXIDE - UNII:LWK91TU9AH)	PIPERONYL BUTOXIDE	4 g in 100 mL

**Inactive Ingredients**

Ingredient Name	Strength
<b>ALCOHOL</b> (UNII: 3K9958V90M)	
<b>WATER</b> (UNII: 059QF0KO0R)	
<b>POLYQUATERNIUM-10 (400 CPS AT 2%)</b> (UNII: HB1401PQFS)	

PEG-25 HYDROGENATED CASTOR OIL (UNII: 0ZNO9PJ9J)

AMMONIUM LAURETH-2 SULFATE (UNII: 698O4Z48G6)

### Product Characteristics

Color	yellow	Score	
Shape		Size	
Flavor		Imprint Code	
Contains			

### Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:79481-2530-8	1 in 1 CARTON	09/01/2023	
1		236 mL in 1 BOTTLE; Type 0: Not a Combination Product		

### Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC Monograph Drug	M031	09/01/2023	

**Labeler** - Meijer, Inc. (006959555)

**Registrant** - Weeks & Leo Co., Inc. (005290028)

### Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
Weeks & Leo Co., Inc.		005290028	manufacture(79481-2530)

Revised: 12/2024

Meijer, Inc.