

**ROMPE PECHO SF FLU SF FLU- brompheniramine maleate, dextromethorphan hbr liquid**  
**Efficient Laboratories Inc**

-----  
**Rompe Pecho SF Flu**

**Active Ingredients:**(in each teaspoonful 5 ml.) **Purpose**

Brompheniramine Maleate 4mg ..... Antihistamine

Dextromethorphan HBr 10 mg ..... Cough Suppressant

**Purpose**

Antihistamine

Cough Suppressant

**Warnings**

**Do not exceed recommended dosage.**

**Do not use**

- If you are taking a prescription monoamine oxidase inhibitor (MAOI) (certain drugs for depression, psychiatric, or emotional conditions or Parkinson's disease), or for 2 weeks after stopping the MAOI drug. If you do not know if your prescription drug contains an MAOI; ask your doctor or pharmacist before taking this product.

**Ask a doctor before use if you have**

- heart disease
- glaucoma
- high blood pressure
- thyroid disease
- diabetes
- difficulty in urination due to an enlarged prostate gland
- a persistent or chronic cough such as occurs with smoking, asthma, or emphysema
  - a cough that is accompanied by excessive phlegm (mucus)
- a breathing problem such as emphysema or chronic bronchitis

**Stop use and ask doctor if**

- symptoms do not improve within 7 days, cough tends to recur, or symptoms are accompanied by a fever, rash or persistent headache. A persistent cough may be

sign of a serious condition.

- nervousness, dizziness, or sleeplessness occurs

**If pregnant or breast-feeding,**ask a health professional before use.

**Keep out of reach of children.** In case of accidental overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

### Directions

- Do not exceed more than 6 doses in any 24-hour period
- Shake well before use
- measure only with dosing cup provided
- keep dosing cup with product
- mL=miliiter TSP=teaspoonful
- this adult product is not intended for use in children under 12 years of age

Age	• Dose
• adults and children 12 years of age and over	• 5 mL (1 teaspoonfuls) every 4 hours
• children under 6 years of age	• do not use

### Uses

- temporarily relieves runny nose, sneezing, itching of the nose or throat, and itchy watery eyes due to hay fever or other upper respiratory allergies
- temporarily relieves cough from the common cold

**Inactive Ingredients:**Blue Cohosh root extract, citric acid, Echinacea root extract, Eucalyptus Oil, Flavor, Ginkgo Biloba leaf extract, glycerin, Golden Seal root extract, Honey, Horehound (flower, leaf, stem) extract, Licorice Root extract, Menthol, Methylparaben, Mullein leaf extract, Myrrh gum extract, Potassium Citrate, Potassium Sorbate, Propylene Glycol, Propylparaben, Slippery Elm Bark extract, Sodium Chloride, Sucralose, Water, Wild Cherry Bark extract and Zinc Sulfate.

### Questions or Comments?

**305-805-3456 Monday - Friday 9AM to 5PM EST**

**[www.efficientlabs.com](http://www.efficientlabs.com)**

### Distributed by

**Efficient Laboratories, Inc., Miami, FL 33166**

**Made in U.S.A.**

**Ask a doctor or pharmacist before use if you are:**

taking tranquilizers or sedatives

### **When using this product**

When using this product • may cause marked drowsiness • avoid alcoholic drinks • Alcohol, sedatives, and tranquilizers may increase drowsiness effect • use caution when driving a motor vehicle or operating machinery • excitability may occur, especially in childrens.

**FLU Multi Symptoms**  
ROMPE PECHO


**Rompe Pecho**

EFFICIENT

**Rompe Pecho**

**FLU Multi Symptom**  
ROMPE PECHO

Itchy Throat  
Watery Eyes  
Runny Nose  
Cough



**ALCOHOL FREE**  
Ibuprofen, Acetaminophen, Minoxidil & more  
Dexamethasone H2O (Anti-inflammatory)  
Dextromethorphan HBr (Cough Suppressant)

Adults & children 12 years & over  
NET WEIGHT: 6 FL Oz (178 mL)



**Drug Facts**

**Active Ingredients** (per each dose, 6 mL) Purpose  
Ibuprofen 400 mg Pain Reliever  
Dextromethorphan HBr 10 mg Cough Suppressant

**Uses** - Temporarily relieves runny nose, sneezing, itching of the nose or throat, and itchy watery eyes due to hay fever or other upper respiratory allergies - Temporarily relieves cough from the common cold.

**Warnings**  
Do not use if you are pregnant or breastfeeding. Ibuprofen is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) and may increase the risk of bleeding. Do not use if you are taking aspirin, other NSAIDs, or blood thinners. Do not use if you have a history of stomach ulcers, kidney disease, or heart disease. Do not use if you have a history of asthma or if you are allergic to aspirin. Do not use if you are taking MAO inhibitors. Do not use if you are taking warfarin or other blood thinners. Do not use if you are taking lithium. Do not use if you are taking digoxin. Do not use if you are taking diuretics. Do not use if you are taking ACE inhibitors. Do not use if you are taking beta-blockers. Do not use if you are taking calcium channel blockers. Do not use if you are taking statins. Do not use if you are taking insulin. Do not use if you are taking antipsychotics. Do not use if you are taking antidepressants. Do not use if you are taking antiepileptics. Do not use if you are taking antiarrhythmics. Do not use if you are taking anti-infectives. Do not use if you are taking anti-parasitics. Do not use if you are taking anti-cancer drugs. Do not use if you are taking anti-hypertensives. Do not use if you are taking anti-diabetics. Do not use if you are taking anti-obesity drugs. Do not use if you are taking anti-cholesterol drugs. Do not use if you are taking anti-epileptics. Do not use if you are taking anti-arrhythmics. Do not use if you are taking anti-infectives. Do not use if you are taking anti-parasitics. Do not use if you are taking anti-cancer drugs. Do not use if you are taking anti-hypertensives. Do not use if you are taking anti-diabetics. Do not use if you are taking anti-obesity drugs. Do not use if you are taking anti-cholesterol drugs.

**Directions**  
Shake well and use as directed. If symptoms do not improve within 7 days, cough lasts by itself, or diarrhea and fever develop, stop use and consult your doctor. A persistent cough may be a sign of a serious condition. Do not use if you are pregnant or breastfeeding. Do not use if you are taking MAO inhibitors or antidiabetic drugs.

**Other information**  
Keep away from children. In case of an overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

**Contains**  
• Do not exceed more than 6 doses in any 24-hour period.  
• Contains 100 mg of acetaminophen per 6 mL dose.  
• Do not use if you are taking aspirin, other NSAIDs, or blood thinners.  
• Do not use if you are taking MAO inhibitors or antidiabetic drugs.  
• This product is not intended for use in children under 12 years of age.

Age	Dose
Children 12 years & over	6 mL (2 tsp) every 6 hours
Children 6-12 years	3 mL (1 tsp) every 6 hours
Children under 12 years of age	Do not use

**Other information**  
Contains 100 mg of acetaminophen per 6 mL dose. Do not use if you are taking aspirin, other NSAIDs, or blood thinners. Do not use if you are taking MAO inhibitors or antidiabetic drugs. This product is not intended for use in children under 12 years of age.

**Contains**  
Ibuprofen 400 mg (Anti-inflammatory)  
Dextromethorphan HBr (Cough Suppressant)  
Minoxidil 1 mg (Anti-inflammatory)  
Acetaminophen 100 mg (Pain Reliever)

**Contains**  
Ibuprofen 400 mg (Anti-inflammatory)  
Dextromethorphan HBr (Cough Suppressant)  
Minoxidil 1 mg (Anti-inflammatory)  
Acetaminophen 100 mg (Pain Reliever)

**Contains**  
Ibuprofen 400 mg (Anti-inflammatory)  
Dextromethorphan HBr (Cough Suppressant)  
Minoxidil 1 mg (Anti-inflammatory)  
Acetaminophen 100 mg (Pain Reliever)

**Contains**  
Ibuprofen 400 mg (Anti-inflammatory)  
Dextromethorphan HBr (Cough Suppressant)  
Minoxidil 1 mg (Anti-inflammatory)  
Acetaminophen 100 mg (Pain Reliever)

**Contains**  
Ibuprofen 400 mg (Anti-inflammatory)  
Dextromethorphan HBr (Cough Suppressant)  
Minoxidil 1 mg (Anti-inflammatory)  
Acetaminophen 100 mg (Pain Reliever)

**Contains**  
Ibuprofen 400 mg (Anti-inflammatory)  
Dextromethorphan HBr (Cough Suppressant)  
Minoxidil 1 mg (Anti-inflammatory)  
Acetaminophen 100 mg (Pain Reliever)


**Contains**  
Ibuprofen 400 mg (Anti-inflammatory)  
Dextromethorphan HBr (Cough Suppressant)  
Minoxidil 1 mg (Anti-inflammatory)  
Acetaminophen 100 mg (Pain Reliever)

EFFICIENT

**Rompe Pecho**

**FLU Multi Sintomas**  
SIN ALCOHOL

Picazón en la Garganta  
Ojos Lagrimosos  
Goteo Nasal  
Tos



**SIN ALCOHOL**  
Equisetum, Eucalyptus, Minoxidil y más  
Dexamethasone H2O (Anti-inflammatory)  
Dextromethorphan HBr (Cough Suppressant)

Adults y Niños mayores de 12 años  
PESO NETO: 6 Oz FL (178 mL)

**Datos Farmacológicos**

**Ingredientes activos** (por cada dosis, 6 mL) Propósito  
Ibuprofeno 400 mg Analgésico  
Dextrometorfano HBr 10 mg Supresor de la tos

**Indicaciones**  
Alivia temporalmente la picazón nasal, los estornudos, la picazón de nariz o garganta y ojos lagrimosos e irritados debido a la fiebre del heno u otros síntomas alérgicos superiores - Alivia temporalmente la tos producida por el resaca común.

**Advertencias**  
No use si está embarazada o lactando.  
No use si está tomando un inhibidor de la bomba de protones (PPI) antes de tomar este medicamento. No use si está tomando aspirina, otros AINEs, o medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado. No use si está tomando anticoagulantes o medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado. No use si está tomando litio. No use si está tomando digoxina. No use si está tomando diuréticos. No use si está tomando ACE inhibidores. No use si está tomando beta bloqueadores. No use si está tomando calcio antagonistas. No use si está tomando estatinas. No use si está tomando insulina. No use si está tomando antipsicóticos. No use si está tomando antidepresivos. No use si está tomando antiepilépticos. No use si está tomando antiarrítmicos. No use si está tomando antibióticos. No use si está tomando antiparasitarios. No use si está tomando anticancerígenos. No use si está tomando antihipertensivos. No use si está tomando antidiabéticos. No use si está tomando antiobesivos. No use si está tomando anticolésterol.

**Precauciones**  
No use si está tomando un inhibidor de la bomba de protones (PPI) antes de tomar este medicamento. No use si está tomando aspirina, otros AINEs, o medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado. No use si está tomando anticoagulantes o medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado. No use si está tomando litio. No use si está tomando digoxina. No use si está tomando diuréticos. No use si está tomando ACE inhibidores. No use si está tomando beta bloqueadores. No use si está tomando calcio antagonistas. No use si está tomando estatinas. No use si está tomando insulina. No use si está tomando antipsicóticos. No use si está tomando antidepresivos. No use si está tomando antiepilépticos. No use si está tomando antiarrítmicos. No use si está tomando antibióticos. No use si está tomando antiparasitarios. No use si está tomando anticancerígenos. No use si está tomando antihipertensivos. No use si está tomando antidiabéticos. No use si está tomando antiobesivos. No use si está tomando anticolésterol.

**Contraindicaciones**  
No use si está tomando un inhibidor de la bomba de protones (PPI) antes de tomar este medicamento. No use si está tomando aspirina, otros AINEs, o medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado. No use si está tomando anticoagulantes o medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado. No use si está tomando litio. No use si está tomando digoxina. No use si está tomando diuréticos. No use si está tomando ACE inhibidores. No use si está tomando beta bloqueadores. No use si está tomando calcio antagonistas. No use si está tomando estatinas. No use si está tomando insulina. No use si está tomando antipsicóticos. No use si está tomando antidepresivos. No use si está tomando antiepilépticos. No use si está tomando antiarrítmicos. No use si está tomando antibióticos. No use si está tomando antiparasitarios. No use si está tomando anticancerígenos. No use si está tomando antihipertensivos. No use si está tomando antidiabéticos. No use si está tomando antiobesivos. No use si está tomando anticolésterol.

**Contraindicaciones**  
No use si está tomando un inhibidor de la bomba de protones (PPI) antes de tomar este medicamento. No use si está tomando aspirina, otros AINEs, o medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado. No use si está tomando anticoagulantes o medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado. No use si está tomando litio. No use si está tomando digoxina. No use si está tomando diuréticos. No use si está tomando ACE inhibidores. No use si está tomando beta bloqueadores. No use si está tomando calcio antagonistas. No use si está tomando estatinas. No use si está tomando insulina. No use si está tomando antipsicóticos. No use si está tomando antidepresivos. No use si está tomando antiepilépticos. No use si está tomando antiarrítmicos. No use si está tomando antibióticos. No use si está tomando antiparasitarios. No use si está tomando anticancerígenos. No use si está tomando antihipertensivos. No use si está tomando antidiabéticos. No use si está tomando antiobesivos. No use si está tomando anticolésterol.

**Contraindicaciones**  
No use si está tomando un inhibidor de la bomba de protones (PPI) antes de tomar este medicamento. No use si está tomando aspirina, otros AINEs, o medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado. No use si está tomando anticoagulantes o medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado. No use si está tomando litio. No use si está tomando digoxina. No use si está tomando diuréticos. No use si está tomando ACE inhibidores. No use si está tomando beta bloqueadores. No use si está tomando calcio antagonistas. No use si está tomando estatinas. No use si está tomando insulina. No use si está tomando antipsicóticos. No use si está tomando antidepresivos. No use si está tomando antiepilépticos. No use si está tomando antiarrítmicos. No use si está tomando antibióticos. No use si está tomando antiparasitarios. No use si está tomando anticancerígenos. No use si está tomando antihipertensivos. No use si está tomando antidiabéticos. No use si está tomando antiobesivos. No use si está tomando anticolésterol.

**Contraindicaciones**  
No use si está tomando un inhibidor de la bomba de protones (PPI) antes de tomar este medicamento. No use si está tomando aspirina, otros AINEs, o medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado. No use si está tomando anticoagulantes o medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado. No use si está tomando litio. No use si está tomando digoxina. No use si está tomando diuréticos. No use si está tomando ACE inhibidores. No use si está tomando beta bloqueadores. No use si está tomando calcio antagonistas. No use si está tomando estatinas. No use si está tomando insulina. No use si está tomando antipsicóticos. No use si está tomando antidepresivos. No use si está tomando antiepilépticos. No use si está tomando antiarrítmicos. No use si está tomando antibióticos. No use si está tomando antiparasitarios. No use si está tomando anticancerígenos. No use si está tomando antihipertensivos. No use si está tomando antidiabéticos. No use si está tomando antiobesivos. No use si está tomando anticolésterol.

**Contraindicaciones**  
No use si está tomando un inhibidor de la bomba de protones (PPI) antes de tomar este medicamento. No use si está tomando aspirina, otros AINEs, o medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado. No use si está tomando anticoagulantes o medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado. No use si está tomando litio. No use si está tomando digoxina. No use si está tomando diuréticos. No use si está tomando ACE inhibidores. No use si está tomando beta bloqueadores. No use si está tomando calcio antagonistas. No use si está tomando estatinas. No use si está tomando insulina. No use si está tomando antipsicóticos. No use si está tomando antidepresivos. No use si está tomando antiepilépticos. No use si está tomando antiarrítmicos. No use si está tomando antibióticos. No use si está tomando antiparasitarios. No use si está tomando anticancerígenos. No use si está tomando antihipertensivos. No use si está tomando antidiabéticos. No use si está tomando antiobesivos. No use si está tomando anticolésterol.

**Contraindicaciones**  
No use si está tomando un inhibidor de la bomba de protones (PPI) antes de tomar este medicamento. No use si está tomando aspirina, otros AINEs, o medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado. No use si está tomando anticoagulantes o medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado. No use si está tomando litio. No use si está tomando digoxina. No use si está tomando diuréticos. No use si está tomando ACE inhibidores. No use si está tomando beta bloqueadores. No use si está tomando calcio antagonistas. No use si está tomando estatinas. No use si está tomando insulina. No use si está tomando antipsicóticos. No use si está tomando antidepresivos. No use si está tomando antiepilépticos. No use si está tomando antiarrítmicos. No use si está tomando antibióticos. No use si está tomando antiparasitarios. No use si está tomando anticancerígenos. No use si está tomando antihipertensivos. No use si está tomando antidiabéticos. No use si está tomando antiobesivos. No use si está tomando anticolésterol.

Edad	Dosis
Adultos y niños de 12 años de edad y más	6 mL (2 cucharadas) cada 6 horas
Niños mayores de 12 años	3 mL (1 cucharada) cada 6 horas
Niños menores de 12 años	No usar

**Contraindicaciones**  
No use si está tomando un inhibidor de la bomba de protones (PPI) antes de tomar este medicamento. No use si está tomando aspirina, otros AINEs, o medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado. No use si está tomando anticoagulantes o medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado. No use si está tomando litio. No use si está tomando digoxina. No use si está tomando diuréticos. No use si está tomando ACE inhibidores. No use si está tomando beta bloqueadores. No use si está tomando calcio antagonistas. No use si está tomando estatinas. No use si está tomando insulina. No use si está tomando antipsicóticos. No use si está tomando antidepresivos. No use si está tomando antiepilépticos. No use si está tomando antiarrítmicos. No use si está tomando antibióticos. No use si está tomando antiparasitarios. No use si está tomando anticancerígenos. No use si está tomando antihipertensivos. No use si está tomando antidiabéticos. No use si está tomando antiobesivos. No use si está tomando anticolésterol.

**Contraindicaciones**  
No use si está tomando un inhibidor de la bomba de protones (PPI) antes de tomar este medicamento. No use si está tomando aspirina, otros AINEs, o medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado. No use si está tomando anticoagulantes o medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado. No use si está tomando litio. No use si está tomando digoxina. No use si está tomando diuréticos. No use si está tomando ACE inhibidores. No use si está tomando beta bloqueadores. No use si está tomando calcio antagonistas. No use si está tomando estatinas. No use si está tomando insulina. No use si está tomando antipsicóticos. No use si está tomando antidepresivos. No use si está tomando antiepilépticos. No use si está tomando antiarrítmicos. No use si está tomando antibióticos. No use si está tomando antiparasitarios. No use si está tomando anticancerígenos. No use si está tomando antihipertensivos. No use si está tomando antidiabéticos. No use si está tomando antiobesivos. No use si está tomando anticolésterol.

**Contraindicaciones**  
No use si está tomando un inhibidor de la bomba de protones (PPI) antes de tomar este medicamento. No use si está tomando aspirina, otros AINEs, o medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado. No use si está tomando anticoagulantes o medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado. No use si está tomando litio. No use si está tomando digoxina. No use si está tomando diuréticos. No use si está tomando ACE inhibidores. No use si está tomando beta bloqueadores. No use si está tomando calcio antagonistas. No use si está tomando estatinas. No use si está tomando insulina. No use si está tomando antipsicóticos. No use si está tomando antidepresivos. No use si está tomando antiepilépticos. No use si está tomando antiarrítmicos. No use si está tomando antibióticos. No use si está tomando antiparasitarios. No use si está tomando anticancerígenos. No use si está tomando antihipertensivos. No use si está tomando antidiabéticos. No use si está tomando antiobesivos. No use si está tomando anticolésterol.

**Contraindicaciones**  
No use si está tomando un inhibidor de la bomba de protones (PPI) antes de tomar este medicamento. No use si está tomando aspirina, otros AINEs, o medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado. No use si está tomando anticoagulantes o medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado. No use si está tomando litio. No use si está tomando digoxina. No use si está tomando diuréticos. No use si está tomando ACE inhibidores. No use si está tomando beta bloqueadores. No use si está tomando calcio antagonistas. No use si está tomando estatinas. No use si está tomando insulina. No use si está tomando antipsicóticos. No use si está tomando antidepresivos. No use si está tomando antiepilépticos. No use si está tomando antiarrítmicos. No use si está tomando antibióticos. No use si está tomando antiparasitarios. No use si está tomando anticancerígenos. No use si está tomando antihipertensivos. No use si está tomando antidiabéticos. No use si está tomando antiobesivos. No use si está tomando anticolésterol.



NR 102020

5.5 Inch

**Drug Facts**

**Active ingredients (by volume, 5 mL):** Pseudoephedrine Hydrochloride 10 mg, Acetaminophen 325 mg, Dextromethorphan HBr 5 mg.


**Uses:** - Temporarily relieves nasal congestion, sore throat, and fever; and helps reduce cough due to hay fever or other upper respiratory allergies. - Temporarily relieves cough that has a runny nose.

**Warnings:** Do not exceed recommended dosage. Do not use if you are ever taking a prescription medicine called MAOI or have taken one in the last 14 days. Do not use if you have ever had a seizure, or if you are taking a medicine called MAOI, or if you are taking a medicine called MAOI, or if you are taking a medicine called MAOI, or if you are taking a medicine called MAOI.

**Directions:** Adults and Children 12 years and over: - 2 tablets 4 times a day. - 12 to 17 years: - 1 tablet 4 times a day. - 6 to 11 years: - 1/2 tablet 4 times a day. - 2 to 5 years: - 1/4 tablet 4 times a day. - 4 to 5 years: - 1/4 tablet 4 times a day. - 4 to 5 years: - 1/4 tablet 4 times a day.

**Other important information:** - Do not use if you are pregnant or breastfeeding. - Do not use if you are taking a medicine called MAOI. - Do not use if you are taking a medicine called MAOI. - Do not use if you are taking a medicine called MAOI.

**Contains:** 9 FL Oz (178 mL)



# Rompe Pecho<sup>®</sup>SF

## FLU

**Sugar Free**

- Antihistamine
- Cough Suppressant
- Decongestant
- Analgesic

**ADVANCED FORMULA**

**ALCOHOL FREE**

**Adults & Children 12 years & over**

**Contents: 9 FL Oz (178 mL)**

**Drug Facts (continued)**

**Directions:** - Do not use if you are pregnant or breastfeeding. - Do not use if you are taking a medicine called MAOI. - Do not use if you are taking a medicine called MAOI. - Do not use if you are taking a medicine called MAOI.

**Other important information:** - Do not use if you are pregnant or breastfeeding. - Do not use if you are taking a medicine called MAOI. - Do not use if you are taking a medicine called MAOI.

**Contains:** 9 FL Oz (178 mL)

3 Inch

brompheniramine maleate, dextromethorphan hbr liquid

## Product Information

<b>Product Type</b>	HUMAN OTC DRUG	<b>Item Code (Source)</b>	NDC:58593-002
<b>Route of Administration</b>	ORAL		

## Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
<b>DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE</b> (UNII: 9D2RT19KYH) (DEXTROMETHORPHAN - UNII:7355X3ROTS)	DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE	10 mg in 5 mL
<b>BROMPHENIRAMINE MALEATE</b> (UNII: IXA7C9Z N03) (BROMPHENIRAMINE - UNII:H57G17P2FN)	BROMPHENIRAMINE MALEATE	4 mg in 5 mL

## Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
<b>ANHYDROUS CITRIC ACID</b> (UNII: XF417D3PSL)	
<b>POTASSIUM CITRATE ANHYDROUS</b> (UNII: 86R1NVR0HW)	
<b>EUCALYPTUS OIL</b> (UNII: 2R04ONI662)	
<b>CAULOPHYLLUM THALICTROIDES ROOT</b> (UNII: JTJ6HH6YEH)	
<b>GLYCERIN</b> (UNII: PDC6A3C0OX)	
<b>ECHINACEA ANGUSTIFOLIA ROOT</b> (UNII: D982V7VT3P)	
<b>GINKGO BILOBA LEAF OIL</b> (UNII: Y5967KO1JH)	
<b>GOLDENSEAL</b> (UNII: ZW3Z11D0JV)	
<b>HONEY</b> (UNII: Y9H1V576FH)	
<b>HOREHOUND</b> (UNII: K08036XEJV)	
<b>MENTHOL</b> (UNII: L7T10EIP3A)	
<b>METHYLPARABEN</b> (UNII: A2I8C7HI9T)	
<b>LICORICE</b> (UNII: 61ZBX54883)	
<b>MULLEIN LEAF</b> (UNII: 9936O846LI)	
<b>POTASSIUM SORBATE</b> (UNII: 1VPU26JZZ4)	
<b>PROPYLENE GLYCOL</b> (UNII: 6DC9Q167V3)	
<b>PROPYLPARABEN</b> (UNII: Z8IX2SC1OH)	
<b>WATER</b> (UNII: 059QF0KOOR)	
<b>ULMUS RUBRA BARK</b> (UNII: 91QY4PXU8Q)	
<b>SODIUM CHLORIDE</b> (UNII: 451W47IQ8X)	
<b>PRUNUS SEROTINA BARK</b> (UNII: 5D48E975HA)	
<b>ZINC SULFATE</b> (UNII: 89DS0H96TB)	
<b>MYRRH</b> (UNII: JC71GJ1F3L)	
<b>SUCRALOSE</b> (UNII: 96K6UQ3ZD4)	

## Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:58593-002-06	178 mL in 1 BOTTLE; Type 0: Not a Combination Product	10/01/2023	

## Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC Monograph Drug	M012	10/01/2023	

**Labeler** - Efficient Laboratories Inc (969044932)

**Registrant** - Efficient Laboratories Inc (969044932)

Revised: 10/2024

Efficient Laboratories Inc