FACE AND BODY SUNSCREEN- octinoxate and titanium dioxide lotion Navarro Discount Pharmacies,LLC

Disclaimer: Most OTC drugs are not reviewed and approved by FDA, however they may be marketed if they comply with applicable regulations and policies. FDA has not evaluated whether this product complies.

Drug Facts

Active Ingredients

Octyl Methoxycinnamate 7% Titanium Dioxide 2.8%

Purpose

Sunscreen

Sunscreen

Use

helps prevent sunburn

Warnings

Skin Cancer/Skin Aging Alert: Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. This product has been shown only to prevent sunburn, **not** skin cancer or early skin aging.

For external use only

Do not use on damaged or broken skin

When using this product

Keep out of eyes. Rinse with water to remove.

Stop use and ask a doctor

if rash occurs

Keep out of reach of children.

If product is swallowed, get medical help or call a Poison Control Center right away.

Directions

- apply liberally 15 minutes before sun exposure
- reapply:
- • after 40 minutes of swimming or sweating
 - immediately after towel drying
 - at least every 2 hours
- children under 6 months: Ask a doctor

Other information

- protect this product from excessive heat and direct sun
- may stain fabrics
- for Lot and Expiration Date, see crimp of tube

Inactive Ingredients

beeswax, carbomer, cetyl alcohol, dimethicone, disodium edta, fragrance, glycerin, glyceryl stearate se, glyceryl stearate and peg-100 stearate, methylparaben, propylene glycol, propylparaben, stearic acid, triethanolamine, water

Package label

Vida Mia Sunscreen Lotion

Drug Facts	
Active ingredients	Purpose
)ctyl Methoxycinnamate 7% Ttanium Dioxide 2.8%	
itanium Dioxide 2.8%	Sunscreen
Uses = helps prevent sunburn	
Varmings Icin Cancer/Skin Aging Alert: Spending time in the sun increases ancer and early skin aging. This product has been shown only to p ot skin cancer or early skin aging. or external use only	your risk of skin prevent sunburn,
Do not use on damaged or broken skin	10
When using this product Keep out of eyes. Rinse with water to ren	nove.
top use and ask a dector if rash occurs	
eep out of reach of children. If product is swallowed, get medica oison Control Center right away.	help or call a
Directions = apply liberally 15 minutes before sun exposure ■ reepply	
nactive ingreater State of the second state of	stearate and
nformación sobre el Medicamento	
ngredientes activos Astoxicinamato de octilo 7% Jóxido de titanio 2.8%	
isos = ayuda a prevenir las quemaduras solares	
Advertencias Movertencia sobre el cáncer de piel/el envejecimiento de la piel: l sol aumenta el riesgo de cáncer de piel y de envejecimiento prer ste producto solamente previene las quemaduras de sol pero no el cancer de piel o el envejecimiento prematuro de la piel causado ara uso externo únicamente	naturo de la piel. protece contra
lo utilice en la piel dañada o herida	
njuague con agua para eliminarlo si hay contacto.	oduce enunción
Juando se utiliza este producto Evite el contacto con los ojos. injuague con agua para eliminarlo si hay contacto. Suspenda el uso de este producto y consulte a un médico si se pr Mantener fuera del alcance de los niños. Si el producto es ingerid yuda médica o llame al Centro de Control de Envenenamiento inn	o, obtenga
injuague con agua para eliminarlo si hay contacto. Ruspenda el uso de este producto y consulte a un médico si se pr Mantener fuera del alcance de los niños. Si el producto es ingerid	o, obtenga nediatamente. kponerse al sol
injuague con agua para eliminarlo si hay contacto. Suspenda el uso de este producto y consulte a un médico si se pr Mantener fuera del alcance de los niños. Si el producto es ingenid yuda médica o llame al Centro de Control de Envenenamiento inn <i>instrucciones</i> = Aplicar generosamente 15 minutos antes de es volver a aplicar: después de 40 minutos de nadar o sudar inmediatamente después de secarse con la to co por lo menos cada 2 horas	o, obtenga nediatamente. kponerse al sol valla sol
injuague con agua para eliminarlo si hay contacto. Suspenda el uso de este producto y consulte a un médico si se pr Mantener fuera del alcance de los niños. Si el producto es ingenid yuda médica o llame al Centro de Control de Envenenamiento inn <i>instrucciones</i> = Aplicar generosamente 15 minutos antes de es «volver a aplicar: después de 40 minutos de nadar o sudar immediatamente después de secarse con la to por lo menos cada 2 horas « Para niños menores de 6 meses: Consulte un médico Dara información « Proteja este producto del calor excesivo y de la luz directa del » Puede manchar las telas	o, obtenga nediatamente. kponerse al sol valla sol o del tubo
injuague con agua para eliminarlo si hay contacto. Suspenda el uso de este producto y consulte a un médico si se pr Mantener fuera del alcance de los niños. Si el producto es ingerid yuda médica o llame al Centro de Control de Envenenamiento inn instrucciones = Aplicar generosamente 15 minutos antes de es volver a aplicar: □ después de 40 minutos de nadar o sudar □ immediatamente después de secarse con la tr □ por lo menos cada 2 horas Para niños menores de 6 meses: Consulte un médico Dara información ■ Proteja este producto del calor excesivo y de la luz directa del ■ Puede manchar las telas ■ LLOTE y la Fecha de Vencimiento aparecen en el borde rizad ngrediendes inactivos Cera de abejas, Carbómero, Alcohol c Limeticona, EDTA disódico, Fragancia, Glicerina, Estearato de glicerico, Proteja esto. Porto	o, obtenga nediatamente. kponerse al sol valla sol o del tubo



FACE AND BODY SUNSCREEN

octinoxate and titanium dioxide lotion

Product Information

Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (So	Item Code (Source) NDC:59970-074	
Route of Administration	TOPICAL			
Active Ingredient/Active Ingre	ctive Moiety			
Ingredient Name Basis of Streng		th Strength		
OCTINOXATE (UNII: 4Y5P7MUD51) (OCTINOXATE - UNII:4Y5P7MUD51) OCTINOXATE		7 mg in 100 mg		
FITANIUM DIO XIDE (UNI	I: 15FIX9 V2JP) (TITANIUM DIO XIDE	L - UNII:15FIX9V2JP)	TITANIUM DIO XIDE	E 2.8 mg in 100 mg
Inactive Ingredients				
	Ingredient Nan	ne		Strength
YELLOW WAX (UNII: 2ZA	.36H0S2V)			
CETYL ALCOHOL (UNII:	936JST6JCN)			
DIMETHICO NE (UNII: 92R	U3N3Y1O)			
EDETATE DISODIUM (UN	II: 7FLD91C86K)			
GLYCERIN (UNII: PDC6A3	COOX)			
GLYCERYL MONOSTEA	RATE (UNII: 230OU9XXE4)			
PEG-100 STEARATE (UNI	I: YD0 1N1999R)			
METHYLPARABEN (UNII:	A2I8C7HI9T)			
PROPYLENE GLYCOL (U	JNII: 6 DC9 Q 16 7 V3)			
PROPYLPARABEN (UNII:	Z8IX2SC1OH)			
STEARIC ACID (UNII: 4EL	V7Z65AP)			
TROLAMINE (UNII: 903K	93S3TK)			
WATER (UNII: 059QF0KO	0 R)			
Packaging				
# Item Code	Package Description	Marketing Start	Date Mar	keting End Date
1 NDC:59970-074-01	113400 mg in 1 TUBE			
Marketing Inform	nation			
Marketing Category	Application Number or Mono	graph Citation Mark	eting Start Date	Marketing End Dat

Labeler - Navarro Discount Pharmacies,LLC (094930963)

Revised: 1/2013

Navarro Discount Pharmacies,LLC