

LICE NO MORE LICE KILLING- piperonyl butoxide, pyrethrum extract shampoo
Weeks & Leo Co., Inc

Piperonyl butoxide 4%

Pyrethrum extract (equivalent to 0.33% pyrethrins)

Lice treatment

For external use only

- pregnant or breastfeeding
- allergic to ragweed. May cause breathing difficulty or an asthmatic attack.
- near eyes
- inside nose, mouth, or vagina
- on lice in eyebrows or eyelashes. See a doctor if lice are present in these areas.
- keep eyes tightly closed and protect eyes with a washcloth or towel
- if product gets into eyes, flush with water right away
- scalp itching or redness may occur
- breathing difficulty occurs
- eye irritation occurs
- skin or scalp irritation continues or infection occurs

If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center (1-800-222-1222) right away.

treats head, pubic (crab), and body lice

- Important: Read warnings before use
- Adults and children 2 years and over:

Inspect

- check each household member with a magnifying glass in bright light for lice/nits (eggs)
- look for tiny nits near scalp, beginning at back of neck and behind ears
- examine small sections of hair at a time
- unlike dandruff which moves when touched, nits stick to the hair
- if either lice or nits are found, treat with this product

Treat

- apply thoroughly to DRY HAIR or other affected area. For head lice, first apply behind ears and to back of neck.
- allow product to remain for 10 minutes, but no longer
- use warm water to form a lather, shampoo, then thoroughly rinse
- for head lice, towel dry hair and comb out tangles

Remove lice and their eggs (nits)

- use a fine-tooth or special lice/nit comb. Remove any remaining nits by hand (using a

throw-away glove).

- hair should remain slightly damp while removing nits
- if hair dries during combing, dampen slightly with water
- for head lice, part hair into sections. Do one section at a time starting on top of the head. Longer hair may take 1 to 2 hours.
- lift a 1-to 2-inch wide strand of hair. Place comb as close to scalp as possible and comb with a firm, even motion away from scalp.
- pin back each strand of hair after combing
- clean comb often. Wipe nits away with tissue and discard in a plastic bag. Seal bag and discard to prevent lice from coming back.
- after combing, thoroughly recheck for lice/nits. Repeat combing if necessary.
- check daily for any lice/nits that you missed

a second treatment must be done in 7 to 10 days to kill any newly hatched lice

- if infestation continues, see a doctor for other treatments
- Children under 2 years: ask a doctor

Call 833-356-6431 Monday to Friday 9:00 am to 7:00 pm EST

ammonium laureth sulfate, fragrance, PEG-25 hydrogenated castor oil, polyquaternium-10, purified water, SD-40 alcohol

- do not freeze
- store at controlled room temperature 20°-25°C (68°-77°F)
- to report serious side effects due to the use of this product call (515) 276-1586
- see package insert for additional information

LICE KILLING SHAMPOO

For the treatment of Head Lice, Pubic (Crab) Lice and Body Lice

DIRECTIONS

IMPORTANT: READ WARNINGS BEFORE USING THIS PRODUCT. A SECOND TREATMENT MUST BE DONE IN 7-10 DAYS TO KILL ANY NEWLY HATCHED LICE EGGS (NITS)

Inspect

- Examine each household member with a magnifying glass in bright light for lice/eggs (nits)
- Look for tiny eggs (nits) near scalp, beginning at the back of neck and behind ears
- Examine small sections of hair
- Unkempt dandruff, which moves when touched, eggs (nits) stick to the hair
- If either lice or eggs (nits) are found, treat with this product

Treat

- Apply thoroughly to dry hair or other affected area. For head lice, first apply behind ears and to back of neck
- Allow product to remain for 10 minutes but no longer
- Use warm water to form a lather, shampoo, then thoroughly rinse
- For head lice, towel dry hair and comb out tangles

To Remove Lice and Their Eggs (Nits)

- Use a special lice comb or fine-toothed comb (included). Remove any remaining eggs (nits) by hand, using a throwaway glove
- Hair should remain slightly damp while removing eggs (nits)
- If hair dries during combing, dampen slightly with water
- For head lice, part hair into sections. Do one section at a time starting on top of the head. Longer hair may take 1 to 2 hours
- Use a 1- to 2-inch wide strand of hair. Place comb as close to scalp as possible and comb with a firm, even motion away from scalp
- Pin back each strand of hair after combing
- Comb often. Wipe egg (nit) away with tissue and discard in a plastic bag. Seal bag and discard to prevent lice from coming back
- After combing, thoroughly check for live/eggs (nits). Repeat combing if necessary
- Check daily for any lice/eggs (nits) that you missed
- A second treatment must be done within 7 to 10 days to kill any newly hatched lice/eggs (nits)
- If infestation continues, see a doctor for other treatments

1. HEAD LICE

- Head lice lay small white eggs (nits) on the hair shaft close to the scalp
- Eggs (nits) are most easily found on the back of the neck or behind the ears
- Disinfect hats, hair ribbons, scarves, coats, towels and bed linens by machine washing in hot water (above 54°C / 130°F), then using the hottest dryer setting for at least 20 minutes
- Items that cannot be washed, dry cleaned or stored may be sprayed with a product designed for this purpose
- Wash all combs and brushes in hot water (above 54°C / 130°F) for at least 10 minutes
- Vacuum all carpets, mattresses, upholstered furniture, and car seats that may have been used by affected people

2. PUBIC (CRAB) LICE

- Pubic (crab) lice may be contracted by sexual contact
- Sexual partners should be treated simultaneously to avoid reinfection
- Lice are very small and look like brown or grey dots on the skin
- Pubic (crab) lice usually cause intense itching and lay small white eggs (nits) on the hair shaft generally close to the skin surface
- Pubic (crab) lice may be present on the short hairs of the groin, thigh, trunk, and underarms, and occasionally on the beard, eyelids, and mustache
- Disinfect underwear by machine washing in hot water (above 54°C / 130°F), then using the hottest dryer setting for at least 20 minutes

3. BODY LICE

- Body lice and their eggs (nits) are generally found in the seams of clothing, particularly in the waistline and armpit areas
- Body lice feed on the skin when returning to clothing to lay their eggs (nits)
- Disinfect underwear by machine washing in hot water (above 54°C / 130°F), then using the hottest dryer setting for at least 20 minutes
- Do not use clothing in a plastic bag because eggs (nits) can remain dormant for up to 30 days

Save this insert for future reference

SHAKE WELL BEFORE USING

LICE KILLING SHAMPOO

For the treatment of Head Lice, Pubic (Crab) Lice and Body Lice

DIRECTIONS

IMPORTANT: READ WARNINGS BEFORE USING THIS PRODUCT. A SECOND TREATMENT MUST BE DONE IN 7-10 DAYS TO KILL ANY NEWLY HATCHED LICE EGGS (NITS)

Inspect

- Examine each household member with a magnifying glass in bright light for lice/eggs (nits)
- Look for tiny eggs (nits) near scalp, beginning at the back of neck and behind ears
- Examine small sections of hair
- Unkempt dandruff, which moves when touched, eggs (nits) stick to the hair
- If either lice or eggs (nits) are found, treat with this product

Treat

- Apply thoroughly to dry hair or other affected area. For head lice, first apply behind ears and to back of neck
- Allow product to remain for 10 minutes but no longer
- Use warm water to form a lather, shampoo, then thoroughly rinse
- For head lice, towel dry hair and comb out tangles

To Remove Lice and Their Eggs (Nits)

- Use a special lice comb or fine-toothed comb (included). Remove any remaining eggs (nits) by hand, using a throwaway glove
- Hair should remain slightly damp while removing eggs (nits)
- If hair dries during combing, dampen slightly with water
- For head lice, part hair into sections. Do one section at a time starting on top of the head. Longer hair may take 1 to 2 hours
- Use a 1- to 2-inch wide strand of hair. Place comb as close to scalp as possible and comb with a firm, even motion away from scalp
- Pin back each strand of hair after combing
- Comb often. Wipe egg (nit) away with tissue and discard in a plastic bag. Seal bag and discard to prevent lice from coming back
- After combing, thoroughly check for live/eggs (nits). Repeat combing if necessary
- Check daily for any lice/eggs (nits) that you missed
- A second treatment must be done within 7 to 10 days to kill any newly hatched lice/eggs (nits)
- If infestation continues, see a doctor for other treatments

1. HEAD LICE

- Head lice lay small white eggs (nits) on the hair shaft close to the scalp
- Eggs (nits) are most easily found on the back of the neck or behind the ears
- Disinfect hats, hair ribbons, scarves, coats, towels and bed linens by machine washing in hot water (above 54°C / 130°F), then using the hottest dryer setting for at least 20 minutes
- Items that cannot be washed, dry cleaned or stored may be sprayed with a product designed for this purpose
- Wash all combs and brushes in hot water (above 54°C / 130°F) for at least 10 minutes
- Vacuum all carpets, mattresses, upholstered furniture, and car seats that may have been used by affected people

2. PUBIC (CRAB) LICE

- Pubic (crab) lice may be contracted by sexual contact
- Sexual partners should be treated simultaneously to avoid reinfection
- Lice are very small and look like brown or grey dots on the skin
- Pubic (crab) lice usually cause intense itching and lay small white eggs (nits) on the hair shaft generally close to the skin surface
- Pubic (crab) lice may be present on the short hairs of the groin, thigh, trunk, and underarms, and occasionally on the beard, eyelids, and mustache
- Disinfect underwear by machine washing in hot water (above 54°C / 130°F), then using the hottest dryer setting for at least 20 minutes

3. BODY LICE

- Body lice and their eggs (nits) are generally found in the seams of clothing, particularly in the waistline and armpit areas
- Body lice feed on the skin when returning to clothing to lay their eggs (nits)
- Disinfect clothing by machine washing in hot water (above 54°C / 130°F), then using the hottest dryer setting for at least 20 minutes
- Do not use clothing in a plastic bag because eggs (nits) can remain dormant for up to 30 days

Save this insert for future reference

SHAKE WELL BEFORE USING

CHAMPÚ PARA MATAR PIOJOS

Para el tratamiento de piojos de cabeza, piojos púbicos (ladillas) y piojos del cuerpo

Para uso externo solamente.

- No lo use cerca de los ojos
- Dentro de la nariz, boca o vagina
- Para piojos en las cejas o pestañas. Consulte a un doctor si hay piojos en estas áreas
- Previamente a un doctor antes de usarlo si es alérgico a la antimonio. Puede provocar dificultades para respirar o un ataque asmático.

Cuando use este producto

- Entregue los ojos bien cerrados y protéjalos con una toallita o toalla
- El producto entra en los ojos, enjuague inmediatamente con agua
- Siempre experimente primero el enjuague del cuero cabelludo
- Deje de usarlo y consulte a un doctor si tiene dificultad para respirar o presenta irritación de los ojos

Evite la irritación de la piel

- El cuero cabelludo o se presenta una infección.
- Si está embarazada o lactando, antes de usarlo consulte a un profesional médico. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Si se oruga, obtenga ayuda médica o póngase en contacto de inmediato con el Centro de Control de Envenenamientos.

INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: LEA LAS ADVERTENCIAS ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. UN SEGUNDO TRATAMIENTO DEBE SER REALIZADO ENTRE 7 Y 10 DÍAS PARA ELIMINAR LA REPRODUCCIÓN DE NUEVOS PIOJOS Y HUEVILLOS (LADILLAS).

Inspección

- Examine a cada uno de los integrantes de la familia bajo luz brillante con una lupa en busca de piojos o huevillitos (ladillas). Busque los huevillitos (ladillas) en el cabello, comenzando en la parte posterior del cuello y detrás de las orejas
- Examine áreas pequeñas del cabello
- Si diferencia de la capa, la cual se mueve al tocarla, los huevillitos (ladillas) permanecerán adheridos al cabello
- Si encuentra piojos o huevillitos (ladillas) trate las áreas afectadas con este producto.

Tratamiento

- Aplique sobre todo el cabello seco o áreas afectadas. Para ladillas de cabeza primero aplique detrás de las orejas y en la parte posterior del cuello. Deje el producto durante 10 minutos, pero no se aceda del tiempo sugerido
- Use agua tibia para formar espuma, lave con champú y enjuague muy bien
- Para ladillas de cabeza, seque el cabello con una toalla y desentende con un peine.

Para eliminar los piojos y sus huevillitos (ladillas)

- Use un peine de dientes finos o un peine especial para piojos y ladillas. Remueva todos los huevillitos (ladillas) restantes a mano usando guantes desechables. El pelo debe permanecer húmedo mientras se remueven los huevillitos (ladillas). Si el pelo se seca mientras el peineado, humedézalo con agua
- Para ladillas de cabeza, divida el pelo en secciones. Tome una sección a la vez comenzando por la parte de arriba de la cabeza. Si tiene pelo largo le puede tomar de 1 a 2 horas
- Inserte mechones de una pulgada de ancho. Ponga el peine lo más cerca posible del cuero cabelludo y peine con movimientos lentos y firmes. Sujete cada mechón de pelo después de peinarlo
- Si el peine continúa con frecuencia. Limpie los huevillitos (ladillas) con un papel toalla y tirelos en una bolsa plástica. Cierre la bolsa y títela para prevenir que los piojos sobrevivan a quienes
- Después de peinar, vuelva a lavar para ver si encuentra piojos o huevillitos (ladillas). Si fuera necesario repita el procedimiento
- Revise a diario para ver si aparece algún piojo o huevillito (ladilla). Si debe efectuar un segundo tratamiento a los 7 a 10 días para matar los huevillitos nuevos (ladillas). Si la infestación continúa debe consultar con el doctor para hacer otro tratamiento.

Otra información

- No lo congelé. Manténgalo del calor excesivo
- Vea la información adicional en el anexo del paquete
- Ingredientes inactivos: laurel sulfato de amonio, fragancia, PEG-20 aceite de ricino hidrogenado, policatén-10, alcohol desnaturalizado SD-40-B, agua

1. PIOJOS DE LA CABEZA

- Los piojos de cabeza ponen huevos blancos (ladillas) en los hebras del cabello cerca del cuero cabelludo. Las ladillas son fáciles de encontrar en la parte posterior del cuello o detrás de las orejas. Desinfecte los sombreros, cintas para el cabello, bufandas, abrigos, toallas y sábanas lavándolas en lavadora con agua caliente (a una temperatura de más de 54°C / 130°F) y luego séquelas en la secadora a la temperatura más alta durante un mínimo de 20 minutos
- Los artículos que no pueden ser lavados (subcamisas, frías, almohadas, juguetes de peluche, etc.) deben ser limpiados en seco o deben ser sellados en bolsas plásticas por 4 semanas, después sacados a la intemperie y sacudidos energicamente antes de ser usados otra vez. Artículos que no pueden ser lavados, limpiados en seco o guardados deben ser sacados con productos desinfectantes para este fin
- Sumerga todos los peines y cepillos en agua caliente (por más de 54°C / 130°F) por lo menos por 10 minutos. Limpie las alfileras, cuchillos, muñecas, tapizados y sillas del caso que pueden haber sido usados por personas infectadas.

2. PIOJOS PÚBLICOS (LADILLAS)

- Los piojos públicos (ladillas) pueden adquirir por contacto sexual. Compáñeros sexuales deben ser tratados simultáneamente para evitar contagios. Los piojos son muy pequeños y parecen puntos café o grises sobre la piel
- Piojos públicos producen picazón muy intensa y pueden causar irritación de la piel
- Los piojos públicos pueden encontrarse en los pelos cortos de las ingles, muslos, axilas y axilas, y ocasionalmente pueden encontrarse en la parte superior de la pierna
- Desinfecte la ropa interior lavándola en lavadora con agua caliente (a una temperatura de más de 54°C / 130°F) y séquela en la secadora a la temperatura más alta durante un mínimo de 20 minutos

3. PIOJOS DE CUERPO

- Los piojos de cuerpo (los ladillos) son generalmente encontrados en los dobladillos de la ropa, particularmente en el elástico de la cintura o en la zona de la axila
- Las ladillas del cuerpo se alimentan de la piel y luego retornan a la ropa para depositar sus huevos (ladillas)
- Desinfecte la ropa lavándola en la lavadora con agua caliente (a una temperatura de más de 54°C / 130°F) y luego use el ciclo más caliente de la secadora por más caliente de la secadora por más de 20 minutos
- No selle la ropa dentro de una bolsa de plástico debido a que los huevillitos (ladillas) pueden permanecer en estado inactivo durante un periodo de hasta 30 días.

Guarde las instrucciones para futuras referencias.

AGÍTESE MUY BIEN ANTES DE USAR

CHAMPÚ PARA MATAR PIOJOS

Para el tratamiento de piojos de cabeza, piojos públicos (ladillas) y piojos del cuerpo

Para uso externo solamente.

- No lo use cerca de los ojos
- Dentro de la nariz, boca o vagina
- Para piojos en las cejas o pestañas. Consulte a un doctor si hay piojos en estas áreas
- Previamente a un doctor antes de usarlo si es alérgico a la antimonio. Puede provocar dificultades para respirar o un ataque asmático.

Cuando use este producto

- Entregue los ojos bien cerrados y protéjalos con una toallita o toalla
- El producto entra en los ojos, enjuague inmediatamente con agua
- Siempre experimente primero el enjuague del cuero cabelludo
- Deje de usarlo y consulte a un doctor si tiene dificultad para respirar o presenta irritación de los ojos

Evite la irritación de la piel

- El cuero cabelludo o se presenta una infección.
- Si está embarazada o lactando, antes de usarlo consulte a un profesional médico. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Si se oruga, obtenga ayuda médica o póngase en contacto de inmediato con el Centro de Control de Envenenamientos.

INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: LEA LAS ADVERTENCIAS ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. UN SEGUNDO TRATAMIENTO DEBE SER REALIZADO ENTRE 7 Y 10 DÍAS PARA ELIMINAR LA REPRODUCCIÓN DE NUEVOS PIOJOS Y HUEVILLOS (LADILLAS).

Inspección

- Examine a cada uno de los integrantes de la familia bajo luz brillante con una lupa en busca de piojos o huevillitos (ladillas). Busque los huevillitos (ladillas) en el cabello, comenzando en la parte posterior del cuello y detrás de las orejas
- Examine áreas pequeñas del cabello
- Si diferencia de la capa, la cual se mueve al tocarla, los huevillitos (ladillas) permanecerán adheridos al cabello
- Si encuentra piojos o huevillitos (ladillas) trate las áreas afectadas con este producto.

Tratamiento

- Aplique sobre todo el cabello seco o áreas afectadas. Para ladillas de cabeza primero aplique detrás de las orejas y en la parte posterior del cuello. Deje el producto durante 10 minutos, pero no se aceda del tiempo sugerido
- Use agua tibia para formar espuma, lave con champú y enjuague muy bien
- Para ladillas de cabeza, seque el cabello con una toalla y desentende con un peine.

Para eliminar los piojos y sus huevillitos (ladillas)

- Use un peine de dientes finos o un peine especial para piojos y ladillas. Remueva todos los huevillitos (ladillas) restantes a mano usando guantes desechables. El pelo debe permanecer húmedo mientras se remueven los huevillitos (ladillas). Si el pelo se seca mientras el peineado, humedézalo con agua
- Para ladillas de cabeza, divida el pelo en secciones. Tome una sección a la vez comenzando por la parte de arriba de la cabeza. Si tiene pelo largo le puede tomar de 1 a 2 horas
- Inserte mechones de una pulgada de ancho. Ponga el peine lo más cerca posible del cuero cabelludo y peine con movimientos lentos y firmes. Sujete cada mechón de pelo después de peinarlo
- Si el peine continúa con frecuencia. Limpie los huevillitos (ladillas) con un papel toalla y tirelos en una bolsa plástica. Cierre la bolsa y títela para prevenir que los piojos sobrevivan a quienes
- Después de peinar, vuelva a lavar para ver si encuentra piojos o huevillitos (ladillas). Si fuera necesario repita el procedimiento
- Revise a diario para ver si aparece algún piojo o huevillito (ladilla). Si debe efectuar un segundo tratamiento a los 7 a 10 días para matar los huevillitos nuevos (ladillas). Si la infestación continúa debe consultar con el doctor para hacer otro tratamiento.

Otra información

- No lo congelé. Manténgalo del calor excesivo
- Vea la información adicional en el anexo del paquete
- Ingredientes inactivos: laurel sulfato de amonio, fragancia, PEG-20 aceite de ricino hidrogenado, policatén-10, alcohol desnaturalizado SD-40-B, agua

1. PIOJOS DE LA CABEZA

- Los piojos de cabeza ponen huevos blancos (ladillas) en los hebras del cabello cerca del cuero cabelludo. Las ladillas son fáciles de encontrar en la parte posterior del cuello o detrás de las orejas. Desinfecte los sombreros, cintas para el cabello, bufandas, abrigos, toallas y sábanas lavándolas en lavadora con agua caliente (a una temperatura de más de 54°C / 130°F) y luego séquelas en la secadora a la temperatura más alta durante un mínimo de 20 minutos
- Los artículos que no pueden ser lavados (subcamisas, frías, almohadas, juguetes de peluche, etc.) deben ser limpiados en seco o deben ser sellados en bolsas plásticas por 4 semanas, después sacados a la intemperie y sacudidos energicamente antes de ser usados otra vez. Artículos que no pueden ser lavados, limpiados en seco o guardados deben ser sacados con productos desinfectantes para este fin
- Sumerga todos los peines y cepillos en agua caliente (por más de 54°C / 130°F) por lo menos por 10 minutos. Limpie las alfileras, cuchillos, muñecas, tapizados y sillas del caso que pueden haber sido usados por personas infectadas.

2. PIOJOS PÚBLICOS (LADILLAS)

- Los piojos públicos (ladillas) pueden adquirir por contacto sexual. Compáñeros sexuales deben ser tratados simultáneamente para evitar contagios. Los piojos son muy pequeños y parecen puntos café o grises sobre la piel
- Piojos públicos producen picazón muy intensa y pueden causar irritación de la piel
- Los piojos públicos pueden encontrarse en los pelos cortos de las ingles, muslos, axilas y axilas, y ocasionalmente pueden encontrarse en la parte superior de la pierna
- Desinfecte la ropa interior lavándola en lavadora con agua caliente (a una temperatura de más de 54°C / 130°F) y séquela en la secadora a la temperatura más alta durante un mínimo de 20 minutos

3. PIOJOS DE CUERPO

- Los piojos de cuerpo (los ladillos) son generalmente encontrados en los dobladillos de la ropa, particularmente en el elástico de la cintura o en la zona de la axila
- Las ladillas del cuerpo se alimentan de la piel y luego retornan a la ropa para depositar sus huevos (ladillas)
- Desinfecte la ropa lavándola en la lavadora con agua caliente (a una temperatura de más de 54°C / 130°F) y luego use el ciclo más caliente de la secadora por más caliente de la secadora por más de 20 minutos
- No selle la ropa dentro de una bolsa de plástico debido a que los huevillitos (ladillas) pueden permanecer en estado inactivo durante un periodo de hasta 30 días.

Guarde las instrucciones para futuras referencias.

AGÍTESE MUY BIEN ANTES DE USAR

apply thoroughly to DRY HAIR or other affected area. For head lice, first apply behind ears and to back of neck.
allow product to remain for 10 minutes, but no longer
use warm water to form a lather, shampoo, then thoroughly rinse
for head lice, towel dry hair and comb out tangles



includes comb

LICE NO MORE LICE KILLING

piperonyl butoxide, pyrethrum extract shampoo

Product Information

Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (Source)	NDC:11383-001
Route of Administration	TOPICAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
PIPERONYL BUTOXIDE (UNII: LWK91TU9AH) (PIPERONYL BUTOXIDE - UNII:LWK91TU9AH)	PIPERONYL BUTOXIDE	4 g in 100 mL
PYRETHRUM EXTRACT (UNII: ZUM06L90GV) (PYRETHRUM EXTRACT - UNII:ZUM06L90GV)	PYRETHRUM EXTRACT	0.33 g in 100 mL

Inactive Ingredients	
Ingredient Name	Strength
AMMONIUM LAURETH-3 SULFATE (UNII: 896SJ235FN)	
WATER (UNII: 059QF0KO0R)	
POLYQUATERNIUM-10 (400 CPS AT 2%) (UNII: HB1401PQFS)	
PEG-25 HYDROGENATED CASTOR OIL (UNII: 0ZNO9PJ9J)	
ALCOHOL (UNII: 3K9958V90M)	

Product Characteristics			
Color	yellow (Cloudy to transparent, cream to straw)	Score	
Shape		Size	
Flavor		Imprint Code	
Contains			

Packaging				
#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:11383-001-04	1 in 1 CARTON	07/01/2025	
1		118 mL in 1 BOTTLE; Type 0: Not a Combination Product		

Marketing Information			
Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC Monograph Drug	M031	07/01/2025	

Labeler - Weeks & Leo Co., Inc (005290028)

Registrant - Weeks & Leo Co., Inc (005290028)

Establishment			
Name	Address	ID/FEI	Business Operations
Weeks & Leo Co., Inc		005290028	manufacture(11383-001)