

## **CONAZOL- miconazole nitrate spray**

Marcas USA LLC

*Disclaimer: Most OTC drugs are not reviewed and approved by FDA, however they may be marketed if they comply with applicable regulations and policies. FDA has not evaluated whether this product complies.*

-----

### **Conazol Spray Powder**

#### **Active Ingredients Purpose**

<b>Active ingredients</b>	<b>Purpose</b>
Miconazole nitrate 2%	Antifungal

#### **Uses**

- effective in the treatment of most athlete's foot, jock itch and ringworm
- relieves itching, cracking, burning and discomfort associated with these conditions

#### **Warnings**

##### **For external use only**

**Flammable:** Do not use while smoking or near heat or flame. Do not puncture or incinerate. Contents under pressure. Do not store at temperature above 120°F (49°C).

##### **When using this product**

- avoid contact with the eyes or mouth
- use only as directed
- intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling contents can be harmful or fatal

##### **Stop use and ask a doctor if**

- irritation occurs
- no improvement within 4 weeks for athlete's foot and ringworm; 2 weeks for jock itch

##### **Keep out of reach of children**

If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away. **Do not use** on children under 2 years of age unless directed by a doctor.

#### **Directions**

- wash affected area and dry thoroughly
- shake can well and spray a thin layer over affected area twice daily (morning and night) or as directed by a doctor
- supervise children in the use of this product
- for athlete's foot, pay special attention to the spaces between the toes; wear well-fitting, ventilated shoes, and change shoes and socks at least once daily
- use daily for 4 weeks for athlete's foot and ringworm; use daily for 2 weeks for jock itch
- if condition persists, consult a doctor

- this product is not effective on the scalp or nails
- in case of clogging, clear nozzle under running water

### **Other Information**

store between 20° and 30°C (68° and 86°F)

### **Inactive Ingredients**

isobutane (propellant), SD alcohol 40-B (14% w/w), stearalkonium hectorite, talc

### **Questions?**

Call Toll-Free 1-800-428-9489

**Distributed By: Marcas USA, LLC, El Segundo, CA 90245**

### ***Datos de Medicamento***

<b><i>Ingrediente Activo</i></b>	<b><i>Propósito</i></b>
Nitrato de miconazol 2%	Antimicótico

### ***Usos***

- eficaz para el tratamiento de la mayoría del pie de atleta, tiña inguinal y tiña
- alivia la comezón, grietas, ardor y molestias asociadas con estas condiciones

### ***Precauciones***

#### **Sólo para uso externo**

**Inflamable:** No usar cerca de flamas, chispas o cuando fume. No perfore ni incinere. Contenido bajo presión. No almacene en temperatura sobre 120°F (49°C).

#### **Al utilizar este producto**

- evite el contacto con los ojos o la boca
- utilizar solo como se indica
- el uso malintencionado, concentrar e inhalar el contenido puede ser dañino o fatal.

#### **Deje de usar y consulte al médico, si**

- presenta irritación
- no hay mejoría del pie de atleta o tiña en un plazo de 4 semanas o tiña inguinal dentro de 2 semanas

#### **Mantener fuera del alcance de los niños.**

En caso de ingestión, obtenga ayuda médica o contacte a un Poison Control Center inmediatamente. **No lo use** en niños menores de 2 años de edad a menos que lo indique un médico.

#### ***Modo de empleo***

- limpie y seque bien el área afectada
- agite bien el envase antes de usar

- aplique una capa fina del producto sobre el área afectada dos veces al día (mañana y noche) o según las indicaciones de un médico
- supervise a los niños en el uso de este producto
- para el pie de atleta, poner especial atención a los espacios entre los dedos de los pies, usar zapatos ventilados y cómodos, cambiar los calcetines y zapatos al menos una vez al día
- para el pie de atleta y tiña usar diariamente por 4 semanas
- para tiña inguinal, usar diariamente por 2 semanas
- si no hay mejora, consulte a su médico
- no es eficaz en el cuero cabelludo o las uñas
- en caso de obstrucción, limpiar boquilla bajo agua corriente

### ***Otra información***

almacene de 20° a 30°C (68° a 86° F)

### ***Ingredientes Anactivos***

isobutano (propelente), SD alcohol 40-B (14% w/w), estearalconio hectorita, talco

### ***¿Preguntas?***

Llame al 1-800-428-9489

**Distributed By: Marcas USA, LLC, El Segundo, CA 90245**

### **PACKAGE LABEL.PRINCIPAL DISPLAY PANEL**

***Maximum Strength***NDC 75940-127-46

**Conazol  
Antifungal**

**MICONAZOLE NITRATE 2%**

**SPRAY POWDER  
SPRAY EN POLVO**

***Cures Most  
Athlete's Foot***

***Cura la Mayoría del  
Pie de Atleta***

***Relieves Itching, Burning & Cracking***

***Alivia la Comézon, Ardor & Grietas***

**LIOMONT**

***NET WT***

***4.6 OZ***

***Peso Neto 130 g***

**Maximum Strength** NDC 75940-127-46



**MICONAZOLE NITRATE 2%**

**SPRAY POWDER**  
**SPRAY EN POLVO**

**Cures Most Athlete's Foot**  
**Cura la Mayoría del Pie de Atleta**

**Relieves Itching, Burning & Cracking**  
**Alivia la Comézon, Ardor & Grietas**

**NET WT 4.6 OZ**  
**Peso Neto 130 g**

**LIOMONT®**

Drug Facts		Datos de Medicamento	
Active ingredient	Purpose	Ingrediente activo	Propósito
Miconazole nitrate 2%	Antifungal	Nitrato de miconazol 2%	Antimicótico
<b>Uses</b> ■ effective in the treatment of most athlete's foot, jock itch and ringworm ■ relieves itching, cracking, burning and discomfort associated with these conditions		<b>Usos</b> ■ eficaz para el tratamiento de la mayoría del pie de atleta, tiña inguinal y tiña ■ alivia la comézon, grietas, ardor y molestias asociadas con estas condiciones	
<b>Warnings</b> For external use only <b>Flammable:</b> Do not use while smoking or near heat or flame. Do not puncture or incinerate. Contents under pressure. Do not store at temperature above 120°F (49° C). <b>When using this product</b> ■ avoid contact with the eyes or mouth ■ use only as directed ■ intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling contents can be harmful or fatal <b>Stop use and ask a doctor if</b> ■ irritation occurs ■ no improvement within 4 weeks for athlete's foot and ringworm; 2 weeks for jock itch		<b>Precauciones</b> Sólo para uso externo <b>Inflamable:</b> No usar cerca de flamas, chispas o cuando fume. No perforar ni incinerar. Contenido bajo presión. No almacenar en temperatura sobre 120°F (49°C). <b>Al utilizar este producto</b> ■ evite el contacto con los ojos o la boca ■ utilizar solo como se indica ■ el uso malintencionado, concentrar e inhalar el contenido puede ser dañino o fatal.	
<b>Keep out of reach of children.</b> If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away. Do not use on children under 2 years of age unless directed by a doctor.		<b>Deje de usar y consulte al médico, si</b> ■ presenta irritación ■ no hay mejoría del pie de atleta o tiña en un plazo de 4 semanas o tiña inguinal dentro de 2 semanas <b>Mantener fuera del alcance de los niños.</b> En caso de ingestión, obtenga ayuda médica o contacte a un Poison Control Center inmediatamente. No lo use en niños menores de 2 años de edad a menos que lo indique un médico.	
<b>Directions</b> ■ wash affected area and dry thoroughly ■ shake can well and spray a thin layer over affected area twice daily (morning and night) or as directed by a doctor ■ supervise children in the use of this product ■ for athlete's foot: pay special attention to spaces between the toes; wear well-fitting, ventilated shoes, and change shoes and socks at least once daily ■ use daily for 4 weeks for athlete's foot and ringworm; use daily for 2 weeks for jock itch ■ if condition persists, consult a doctor ■ this product is not effective on the scalp or nails ■ in case of clogging, clear nozzle under running water		<b>Modo de empleo</b> ■ limpie y seque bien el área afectada ■ agite bien el envase antes de usar ■ aplique una capa fina del producto sobre el área afectada dos veces al día (mañana y noche) o según las indicaciones de un médico ■ supervise a los niños en el uso de este producto ■ para el pie de atleta, poner especial atención a los espacios entre los dedos de los pies, usar zapatos ventilados y cómodos, cambiar los calcetines y zapatos al menos una vez al día ■ para el pie de atleta y tiña usar diariamente por 4 semanas ■ para tiña inguinal, usar diariamente por 2 semanas ■ si no hay mejoría, consulte a su médico ■ no es eficaz en el cuero cabelludo o las uñas ■ en caso de obstrucción, limpiar boquilla bajo agua corriente	
<b>Other information</b> store between 20° and 30°C (68° and 86°F)		<b>Otra información</b> almacene de 20° a 30°C (68° a 86°F)	
<b>Inactive ingredients</b> isobutane (propellant), SD alcohol 40-B (14% w/w), stearylaluminum hydroxide, talc		<b>Ingredientes inactivos</b> isobutano (propelente), SD alcohol 40-B (14% w/w), estearaluminio hidróxido, talco	
<b>Questions?</b> Call 1-800-428-9489		<b>¿Preguntas?</b> Lláme al 1-800-428-9489	



CON4001A0314 46-031MA Distributed By: MarcasUSA, LLC, El Segundo, CA 90245

## CONAZOL

miconazole nitrate spray

### Product Information

Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (Source)	NDC:75940-127
Route of Administration	TOPICAL		

### Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
MICONAZOLE NITRATE (UNII: VW4HICYW1K) (MICONAZOLE - UNII:7NNO0D7S5M)	MICONAZOLE NITRATE	20 mg in 1 g

### Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
ISOBUTANE (UNII: BXR49TP611)	
ALCOHOL (UNII: 3K9958V90M)	

**STEARALKONIUM HECTORITE** (UNII: OLX698AH5P)

**TALC** (UNII: 7SEV7J4R1U)

### Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:75940-127-46	130 g in 1 CAN; Type 0: Not a Combination Product	06/25/2014	

### Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC monograph final	part333C	06/25/2014	

**Labeler** - MarcasUSA LLC (016139820)

### Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
Laboratorios Liomont, S.A. de C.V.		814377396	manufacture(75940-127)

Revised: 1/2020

MarcasUSA LLC