

**ACETAMINOPHEN, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE, CHLORPHENIRAMINE
MALEATE- acetaminophen, phenylephrine hydrochloride, chlorpheniramine
maleate tablet, film coated
Contract Pharmacal Corp.**

2634 - Export

Belarus Label



АНТИФЛУ

Важно!

10741/18/13
Нью-Йорк 11788, США
135 Avenue Avenue, Холлс
Контракт фармацевт Корпорейшн,
Провиденс:
Bayer Консьюмер Кар АГ, Швейцария

Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке.
Хранить в оригинальной упаковке.
Хранить в оригинальной упаковке.

Условия отпуска
Без рецепта.

Способ применения и дозы
Таблетки следует проглатывать целиком, за-
пивая водой.
Взрослым: по 1-2 таблетки, при необходимости
повторить прием каждые 4-6 часов, но не
более 8 таблеток в сутки.
Дети старше 12 лет: по 1 таблетке, при необ-
ходимости повторить прием каждые 4-6 ча-
сов.
Препарат не рекомендуется принимать у де-
тей до 12 лет.
Пациентам с нарушением функции печени,
почек рекомендуется уменьшить суточную
дозу препарата и увеличить интервал между
введениями.

Средство для облегчения симптомов
острых респираторных заболеваний
и гриппа

Срок годности
3 года. Не использовать по истечении срока
для детей и подростков.

Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке.
Хранить в оригинальной упаковке.
Хранить в оригинальной упаковке.

Условия отпуска
Без рецепта.

Способ применения и дозы
Таблетки следует проглатывать целиком, за-
пивая водой.
Взрослым: по 1-2 таблетки, при необходимости
повторить прием каждые 4-6 часов, но не
более 8 таблеток в сутки.
Дети старше 12 лет: по 1 таблетке, при необ-
ходимости повторить прием каждые 4-6 ча-
сов.
Препарат не рекомендуется принимать у де-
тей до 12 лет.
Пациентам с нарушением функции печени,
почек рекомендуется уменьшить суточную
дозу препарата и увеличить интервал между
введениями.

Средство для облегчения симптомов
острых респираторных заболеваний
и гриппа

АНТИФЛУ

АНТИФЛУ

Средство для облегчения симптомов
острых респираторных заболеваний
и гриппа

7877

АНТИФЛУ



Средство для облегчения симптомов
острых респираторных заболеваний
и гриппа:

- повышенной температуры
- мышечно-суставной
- и головной боли
- заложенности носа
- насморка
- слезотечения



12
таблеток,
покрытых оболочкой

АНТИФЛУ

Средство для облегчения симптомов
острых респираторных заболеваний
и гриппа

Kazakhstan Label



АНТИФЛУ®

АНТИФЛУ®



Bayer
байер

107651/KZ17

1324 Motor Parkway, Холт, Нью-Йорк 11788, США/ҚШ

Улавошин/Қаттаулы: Контракт Фармакал Корпорейшн,
150 и/және 160 Коммерс Драйв, Холт, Нью-Йорк 11788, США/ҚШ

Производитель/Өндіруші: Контракт Фармакал Корпорейшн,
Байер Консьюмер Кар АГ, с. Базель/Базель қаласы, Швейцария

Держатель регистрационного удостоверения/Тіркеу куәлігінің ұстаушысы:

12 таблетка, покрытых пленочной оболочкой.

по медицинскому применению.

Порядокую информацию см. в инструкции

без рецепта.

Не применять по истечении срока годности.

Хранить в недоступном для детей месте!

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Продолжительность лечения – не более 3 дней.

Каждая доза не более 8 таблеток в сутки.

Летом принимать с водой. Максимальная суточ-

ная доза по 1-2 таблетке каждые 4 часа. Таб-

летки принимать по 1-2 таблетке

каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

таблетке каждые 4 часа. Таблетки принимать по 1-2

Сервис/ Серисы:
Дата производства -
Формула/
Өндірілген күні -
Деткі жарамды:

Средство для облегчения симптомов
острых респираторных заболеваний и гриппа
Жедел респираторлық аурулар және тұмау
симптомдарын жеңілдетуге арналған дәрі

АНТИФЛУ®

АНТИФЛУ® Средство для облегчения симптомов
острых респираторных заболеваний и гриппа

АНТИФЛУ®



Средство для облегчения симптомов
острых респираторных заболеваний и гриппа
Жедел респираторлық аурулар және тұмау
симптомдарын жеңілдетуге арналған дәрі

повышенной температуры
мышечно-суставной
и головной боли
заложенности носа
насморка
слезотечения

температура жоғарылауы
бұлшықет-буын
және бас ауырулары
мұрын бітелуі
тұмау
жас ағушылық

PK-AC-5№002248
ҚР-ДЗ-5№002248



12

АНТИФЛУ®

Жедел респираторлық аурулар және
симптомдарын жеңілдетуге арналған

ЛАСС

12
таблеток/таблетка

а Тумачу
и Аерл

Ukraine Label



АНТИФЛУ®

Байер
Bayer

Виробник:
Контракт Фармакал Корпорейшн
135 Адамс Авеню, Хопор,
Нью-Йорк 11788, США
10734/1/UA/6

РП № UA/4910/01/01

Списіб застосування та дози
Дорослі та діти віком від 12 років: 2 таб-
летки як разова доза кожні 4 години.
Запивати водою. Максимальну добову
дозу, 12 таблеток протягом доби, не
слід перевищувати.
Максимальний термін застосування
без консультації лікаря – 3 дні.
Подальше застосування можливе ли-
ше під наглядом лікаря.

**Комбінований жарознижувальний,
знеболювальний і протизапальний засіб**

Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при
температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей
місці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Для детальної інформації див. інструк-
цію для медичного застосування.

Показання
Симптоматичне лікування грипу, гост-
рих респіраторних вірусних інфекцій
та застуди з метою зниження темпе-
ратури, усунення головного болю, болю
у м'язах та суглобах, набряку слизової
оболонки дихальних шляхів.

Склад
1 таблетка містить діючі речовини:
ацетамінофену 325 мг (мг),
фенілефрину гідрохлориду 5 мг (мг),
хлорфеніраміну малеату 2 мг (мг).

АНТИФЛУ®

АНТИФЛУ®

**Комбінований жарознижувальний,
знеболювальний і протизапальний засіб**

АНТИФЛУ®



АПІФЕН



Комбінований жарознижувальний,
знеболювальний і протизапальний засіб

Знижує температуру

Усуває:

головний біль,

біль у м'язах та суглобах,

набряк слизової оболонки дихальних шляхів,

ринорею, слезотечу та свербіж в очах та носі



12

таблеток, вкритих
плівковою оболонкою

ACETAMINOPHEN, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE, CHLORPHENIRAMINE MALEATE

acetaminophen, phenylephrine hydrochloride, chlorpheniramine maleate tablet, film coated

Product Information

Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (Source)	NDC:10267-2634
Route of Administration	ORAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
ACETAMINOPHEN (UNII: 362O9ITL9D) (ACETAMINOPHEN - UNII:362O9ITL9D)	ACETAMINOPHEN	325 mg
CHLORPHENIRAMINE MALEATE (UNII: V1Q0O9OJ9Z) (CHLORPHENIRAMINE - UNII:3U6IO1965U)	CHLORPHENIRAMINE MALEATE	2 mg
PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE (UNII: 04JA59TNSJ) (PHENYLEPHRINE - UNII:1WS297W6MV)	PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE	5 mg

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
D&C YELLOW NO. 10 (UNII: 35SW5USQ3G)	

POLYETHYLENE GLYCOL 400 (UNII: B6978945GQ)
STARCH, CORN (UNII: O8232NY3SJ)
MAGNESIUM STEARATE (UNII: 70097M6I30)
HYPROMELLOSES (UNII: 3NXW29V3WO)
POVIDONE K30 (UNII: U725QWY32X)
SILICON DIOXIDE (UNII: ETJ7Z6XBU4)
SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A POTATO (UNII: 5856J3G2A2)
STEARIC ACID (UNII: 4ELV7Z65AP)
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE (UNII: OP1R32D61U)
CROSCARMELLOSE SODIUM (UNII: M28OL1HH48)
TALC (UNII: 7SEV7J4R1U)
LIGHT MINERAL OIL (UNII: N6K5787QVP)

Product Characteristics

Color	yellow	Score	no score
Shape	OVAL	Size	16mm
Flavor		Imprint Code	AntiFlu
Contains			

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:10267-2634-7	1 in 1 CARTON	03/22/2010	
1		12 in 1 BLISTER PACK; Type 0: Not a Combination Product		

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
Export only		03/22/2010	

Labeler - Contract Pharmacal Corp. (057795122)

Revised: 11/2022

Contract Pharmacal Corp.