

CHUNG SOL DISINFECTION ETHANOL- alcohol spray

Samhyun pharma

Disclaimer: Most OTC drugs are not reviewed and approved by FDA, however they may be marketed if they comply with applicable regulations and policies. FDA has not evaluated whether this product complies.

ACTIVE INGREDIENT

Active ingredients: Ethanol 83% v/v

INACTIVE INGREDIENT

Inactive ingredients:

Water

PURPOSE

Purpose: ANTISEPTIC

WARNINGS

Warnings:

For external use only. Flammable. Keep away from heat or flame

Do not use

- in children less than 2 months of age
- on open skin wounds

When using this product keep out of eyes, ears, and mouth. In case of contact with eyes, rinse eyes thoroughly with water.

Stop use and ask a doctor if irritation or rash occurs. These may be signs of a serious condition.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

Uses

Uses:

Hand sanitizer to help reduce bacteria that potentially can cause disease.

Directions

Directions:

- Place enough product on hands to cover all surfaces. Rub hands together until dry.
- Supervise children under 6 years of age when using this product to avoid swallowing.

Other information

Other information

- Store between 15-30C (59-86F)
- Avoid freezing and excessive heat above 40C (104F)

PACKAGE LABEL.PRINCIPAL DISPLAY PANEL

Chung-Sol Disinfection Ethanol

| Drug Facts | |
|--|------------------------------|
| Active ingredients Ethanol 83% v/v | Purpose ANTISEPTIC |
| Uses Hand sanitizer to help reduce bacteria that potentially can cause disease. | |
| Warnings For external use only. Flammable. Keep away from heat or flame | |
| <ul style="list-style-type: none"> • in children less than 2 months of age • on open skin wounds | |
| When using this product keep out of eyes, ears, and mouth. In case of contact with eyes, rinse eyes thoroughly with water. | |
| Stop use and ask a doctor if irritation or rash occurs. These may be signs of a serious condition. | |
| Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away. | |
| Directions | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Place enough product on hands to cover all surfaces. Rub hands together until dry. • Supervise children under 6 years of age when using this product to avoid swallowing. | |
| Other information | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Store between 15-30C (59-86F) • Avoid freezing and excessive heat above 40C (104F) | |
| Inactive ingredients Water | |

SAM-HYUN Pharmaceutical Co., Ltd
26 Ganghwa-dare 967byeon-gil, Hajeom-myeon, Ganghwa-gun, Incheon, Republic of Korea

청솔 소독용 에탄올

CHUNG-SOL
Antiseptic Ethanol

ANTISEPTIC & DISINFECTANT

Net Wt:
300mL(10.14 Fl.Oz)

의약품
분류번호46000

전문의약품 제조기업 —
(주)삼현제약
인헌광역시 강화군 하점면 강화대로 967번길 26 대표전화 : 032-932-4532

[품명] 청솔 소독용에탄올

[원료약품 및 그분량 100ml중] 유효 성분: 에탄올(KP) ... 83ml 기타첨가제: 정제수

[성상] 무색의 맑은 액 **[효능 효과]** 1. 손 및 피부의 소독 2. 수술부위 피부의 소독

[용법·용량] 소독 부위에 바른다. **[저장방법]** 차광기밀용기에 넣어 화기를 피하여 보존 한다. 실온보관(1°C~30°C) *사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다. *이 약은 의외용제이므로 복용하지 말것.

[사용상 주의사항] 1. 다음 부위에는 투여하지 말 것. 구강 내 점막 및 손상된 피부(자극작용이 있다) 2. 부작용 1) 발진 등 과민증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우 사용을 중지한다. 2) 피부: 자극증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우 사용을 중지한다. 3. **약용상의 주의**: 외용오르만 사용한다. 1) 눈에 들어가지 않도록 주의하며 만약 들어간 경우에는 물로 깨끗이 씻어낸다. 2) 광범위하게 또는 장기간 사용하는 경우 증기를 흡입하지 않도록 주의한다.(에탄올 증기를 대량 또는 반복하여 마시는 경우 점막에 자극, 두통 등이 나타날 수 있다.) 3) 동일 부위에 반복 사용하는 경우에는 탈지(脫脂) 등으로 피부가 거칠어 질 수 있으므로 주의한다. 4) 혈청, 동 등의 유기물질은 이 약의 살균작용을 약화시키므로 이 때 사용하는 의료용구등의 소독에 이 약을 사용하는 경우 이 약으로 용구를 충분히 씻어낸 후 사용한다. 5) 인화성, 폭발성이 있으므로 화기(전기메스 사용을 포함)에 주의한다. 6) 합성고무제품, 합성수지제품, 광학기구, 유리기구, 도장 (塗裝)한 카테터 등에 사용은 피하는 것이 바람직 하다. 7) 금속기구를 장시간 담가 둘 필요가 있는 경우 부식을 방지 하기 위해 0.2-1%의 아질산나트륨을 첨가한다. 4. **저장상의 주의사항** 차광기밀용기에 넣어 화기를 피하여 보존한다.

제조번호 : EH20-302 HDPE 사용기한 : 2023. 04. 10

CHUNG SOL DISINFECTION ETHANOL

alcohol spray

| Product Information | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| Product Type | HUMAN OTC DRUG | Item Code (Source) | NDC:75765-010 |
| Route of Administration | TOPICAL | | |

| Active Ingredient/Active Moiety | | |
|--|-------------------|------------------|
| Ingredient Name | Basis of Strength | Strength |
| ALCOHOL (UNII: 3K9958V90M) (ALCOHOL - UNII:3K9958V90M) | ALCOHOL | 249 mL in 300 mL |

| Inactive Ingredients | |
|--------------------------|----------|
| Ingredient Name | Strength |
| Water (UNII: 059QF0K00R) | |

| Packaging | | | | |
|-----------|---------------|--|----------------------|--------------------|
| # | Item Code | Package Description | Marketing Start Date | Marketing End Date |
| | NDC:75765-010 | 300 mL in 1 BOTTLE, SPRAY, Type 0; Not a Combination | | |

| | | | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------|--|
| 1 | NDC:75765-010-01 | 300 mL III BOTTLE, SPRAY; Type O: Not a Combination Product | 04/01/2020 | |
| Marketing Information | | | | |
| Marketing Category | Application Number or Monograph Citation | Marketing Start Date | Marketing End Date | |
| OTC monograph not final | part333E | 04/01/2020 | | |

Labeler - Samhyun pharma (694185214)

Registrant - Samhyun pharma (694185214)

Establishment

| Name | Address | ID/FEI | Business Operations |
|----------------|---------|-----------|------------------------|
| Samhyun pharma | | 694185214 | manufacture(75765-010) |

Revised: 4/2020

Samhyun pharma