BLUE- absorbent blue lotion liniment JACKS MFG INC

Disclaimer: This drug has not been found by FDA to be safe and effective, and this labeling has not been approved by FDA. For further information about unapproved drugs, click here.

BLUE LOTION

INDICATIONS

To be used as an aid in the temporary relief of minor soreness and stiffness caused by overexertion.

DIRECTIONS

CLEANSE AFFECTED AREA BEFORE APPLICATION.

Apply to affected areas one or two times daily.

May be used under absorbent cotton and bandages.

For a greater sweating effect, place plastic wrap on the outside of the cottons.

CAUTION

Use only as directed.

Do not take internally.

Discontinue use if excessive irritation develops.

Do not apply to already irritated skin.

Consult your Veterinarian if redness and/or swelling increases.

Avoid eyes and mucus membranes.

Not for use on horses intended for food.

FOR EXTERNAL EQUINE USE ONLY KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Package Label

MCTARNAHANS®



ABSORBENT BLUE LOTION

ABSORBENTE LOCION BLUE

A counter-irritant liniment in a thick non-greasy form to be used as an aid in the temporary relief of minor soreness and stiffness $\,$ caused by overexertion.

Un linimento anti-irritante en una forma que es gruesa y no grasa para uso como ayuda en el alivio temporal de rigidezy dolor leve causado por el sobre esfuerzo.

Net Contents: One Pint (16 fl oz) Contenido Neto: Una Pinta (16 onzas fluídas)

PRODUCTS WITH A WINNING TRADITION



ABSORBENT BLUE LOTION

INDICATIONS:

To be used as an aid in the temporary relief of minor soreness and stiffness caused by overexertion.

DIRECTIONS:

CLEANSE AFFECTED AREA BEFORE APPLICATION. Apply to affected areas one or two times daily. May be used under absorbent cotton and bandages. For a greater sweating effect, place plastic wrap on the outside of the cottons

ACTIVE INGREDIENTS:

Methyl Salicylate	.3	.0	%
Menthol			
Camphor	1	7	9/

INACTIVE INGREDIENTS:

Deionized Water, Glyceryl Stearate, Isopropyl Alcohol, Sorbitol, Carbomer, Triethanolamine, Methyl Paraben, Propyl Paraben, FD & C Blue#1.

CAUTION:
Use only as directed. Do not take internally.
Discontinue use if excessive irritation develops. Do not apply to already irritated skin. Consult your Veterinarian if redness and/or swelling increases. Avoid eyes and mucus membranes. Not for use on horses intended for food.

FOR EXTERNAL EQUINE USE ONLY KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

INDICACIONES:

Para uso como ayuda en el alivio temporal de dolor leve y rigidez causado por el sobre esfuerzo.

INSTRUCIONES:

LIMPIE LA ZONA AFECTADA ANTES DE APLICAR. Aplique a la zona afectada una o dos veces cada día. Se puede utilizar debajo de algodón y vendajes. Para un efecto más fuerte de sudadación, coloque una envoltura de plástico en el exterior de las prendas de algodón.

INGREDIENTES ACTIVOS:

Methyl Salicylate3.09
Menthol1.79
Camphor 1 79

INGREDIENTES INACTIVOS:

Deionized Water, Glyceryl Stearate, Isopropyl Alcohol, Sorbitol, Carbomer, Triethanolamine, Methyl Paraben, Propyl Paraben, FD & C Blue#1.

ADVERTENCIA:

Utilice únicamente según las indicaciones. Solo para uso externo. Si se desarrolla una irritación excesiva, discontinue el tratamiento. No aplique a la piel ya irritada. Consulte a un veterinario si hay un aumento en enrojecimiento y la inflamación. Evite el contacto con los ojos y las membranas mucosas. No lo use en caballos destinados a la alimentación.

SÓLO PARA USO EXTERNO EQUINO MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



MANUFACTURED IN USA FOR JACKS INC. WASHINGTON C.H. OHIO 43160

CTARNAHANS®



ABSORBENT

A counter-irritant liniment in a thick non-greasy form to be used as an aid in the temporary relief of minor soreness and stiffness caused by overexertion.

Un linimento anti-irritante en una forma que es gruesa y no grasa para uso como ayuda en el alivio temporal de rigidez y dolor leve causado por el sobre esfuerzo.

Net Contents: One Quart (32 fl oz) Contenido Neto: Un Cuarto (32 onzas líquidas)

PRODUCTS WITH A WINNING TRADITION



ABSORBENT BLUE LOTION

INDICATIONS:

To be used as an aid in the temporary relief of minor soreness and stiffness caused by overexertion.

DIRECTIONS:

CLEANSE AFFECTED AREA BEFORE APPLICATION. Apply to affected areas one or two times daily. May be used under absorbent cotton and bandages. For a greater sweating effect, place plastic wrap on the outside of the cottons.

ACTIVE INGREDIENTS:

Methyl Salicylate	3.0%
Menthol	
Camphor	1 7%

INACTIVE INGREDIENTS:

Deionized Water, Glyceryl Stearate, Isopropyl Alcohol, Sorbitol, Carbomer, Triethanolamine, Methyl Paraben, Propyl Paraben, FD & C Blue#1.

CAUTION: Use only as directed. Do not take internally. Discontinue use if excessive irritation develops. Do not apply to already irritated skin. Consult your Veterinarian if redness and/or swelling increases. Avoid eyes and mucus membranes. Not for use on horses intended for food.

> FOR EXTERNAL EQUINE USE ONLY KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

INDICACIONES:

Para uso como ayuda en el alivio temporal de dolor leve y rigidez causado por el sobre esfuerzo.

INSTRUCIONES: LIMPIE LA ZONA AFECTADA ANTES DE APLICAR. Aplique a la zona afectada una o dos veces cada día. Se puede utilizar debajo de algodón y vendajes. Para un efecto más fuerte de sudadación, coloque una envoltura de plástico en el exterior de las prendas de algodón.

INGREDIENTES ACTIVOS:

Methyl Salicylate3.0	Ŋ
Menthol1.7	9
Camphor1.7	%

INGREDIENTES INACTIVOS:

Deionized Water, Glyceryl Stearate, Isopropyl Alcohol, Sorbitol, Carbomer, Triethanolamine, Methyl Paraben, Propyl Paraben, FD & C Blue#1

ADVERTENCIA:

Utilice únicamente según las indicaciones. Solo para uso externo. Si se desarrolla una irritación excesiva, discontinue el tratamiento. No aplique a la piel ya irritada. Consulte a un veterinario si hay un aumento en enrojecimiento y la inflamación. Evite el contacto con los ojos y las membranas mucosas. No lo use en caballos destinados a la alimentación.

SÓLO PARA USO EXTERNO EQUINO MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



MANUFACTURED IN USA FOR JACKS INC. WASHINGTON C.H. OHIO 43160



ABSORBENT BLUE LOTION

INDICATIONS:

To be used as an aid in the temporary relief of minor soreness and stiffness caused by overexertion.

DIRECTIONS:
CLEANSE AFFECTED AREA BEFORE
APPLICATION, Apply to affected areas one or two
times daily. May be used under absorbent cotton and
bandages. For a greater sweating effect, place
plastic wrap on the outside of the cottons.

ACTIVE INGREDIENTS:
Methyl Salicylate 3.0%
Menthol 1.7%
Camphor. 1.7%

INACTIVE INGREDIENTS:

Deionized Water, Glyceryl Stearate, Isopropyl Alcohol, Sorbitol, Carbomer, Triethanolamine, Methyl Paraben, Propyl Paraben, FD & C Blue#1.

Paraben, Propyl Paraben, FD & C Blue#1.

CAUTION:
Use only as directed. Do not take internally.
Discontinue use if excessive irritation develops. Do not apply to already irritated skin. Consult your Veterinarian if redness and/or swelling increases. Avoid eyes and mucus membranes. Not for use on horses intended for food.

FOR EXTERNAL EQUINE USE ONLY KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

INDICACIONES:

Para uso como ayuda en el allivio temporal de dolor leve y rigidez causado por el sobre esfuerzo.

INSTRUCIONES:
LIMPIE LA ZONA AFECTADA ANTES DE APLICAR
Aplique a la zona afectada una o dos veces cada día.
Se puede utilizar debajo de algodón y vendajes. Para un efecto más fuerte de sudadación, coloque una envoltura
de plástico en el exterior de las prendas de algodón.

INGREDIENTES ACTIVOS:				
Methyl Salicylate	3.0%			
Menthol	1.7%			
Camphor	4 79/			

INGREDIENTES INACTIVOS:

Deionized Water, Glyceryl Stearate, Isopropyl Alcohol, Sorbitol, Carbomer, Triethanolamine, Methyl Paraben, Propyl Paraben, FD & C Blue#1.

ADVERTENCIA:

Utilice únicamente según las indicaciones. Solo para uso externo. Si se desarrolla una irritación excesiva, discontinue el tratamiento. No aplique a la piel ya irritada. Consulte a un veterinario si hay un aumento en enrojecimiento y la inflamación. Evite el contlacto con los ojos y las membranas mucosas. No lo use en caballos destinados a la alimentación.

SÓLO PARA USO EXTERNO EQUINO MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



MANUFACTURED IN USA FOR JACKS INC. WASHINGTON C.H. OHIO 43160

BLUE

absorbent blue lotion liniment

Product Information

Product Type OTC ANIMAL DRUG **Item Code (Source)** NDC:61156-202

Route of Administration TOPICAL

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
METHYL SALICYLATE (UNII: LAV5U5022Y) (SALICYLIC ACID - UNII: O414PZ4LPZ)	METHYL SALICYLATE	0.0364 g in 1 mL
MENTHOL (UNII: L7T10EIP3A) (MENTHOL - UNII:L7T10EIP3A)	MENTHOL	0.01688 g in 1 mL
CAMPHOR (NATURAL) (UNII: N20HL7Q941) (CAMPHOR (NATURAL) - UNII:N20HL7Q941)	CAMPHOR (NATURAL)	0.01688 g in 1 mL

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
PROPYLPARABEN (UNII: Z8IX2SC10H)	0.00039 g in 1 mL
METHYLPARABEN (UNII: A2I8C7HI9T)	0.00145 g in 1 mL
CARBOMER 934 (UNII: Z135WT9208)	0.0017 g in 1 mL
FD&C BLUE NO. 1 (UNII: H3R47K3TBD)	0.00003 g in 1 mL
SORBITOL (UNII: 506T60A25R)	0.03433 mL in 1 mL
GLYCERYL STEARATE SE (UNII: FCZ5MH785I)	0.0421 g in 1 mL
TROLAMINE (UNII: 903K93S3TK)	0.0026 g in 1 mL
ISOPROPYL ALCOHOL (UNII: ND2M416302)	0.0042 mL in 1 mL
WATER (UNII: 059QF0KO0R)	0.8425 mL in 1 mL

P	Packaging					
#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date		
1	NDC:61156-202-02	12 in 1 BOX				
1		473 mL in 1 BOTTLE				
2	NDC:61156-202-03	12 in 1 BOX				
2		946 mL in 1 BOTTLE				
3	NDC:61156-202-04	4 in 1 BOX				
3		3785 mL in 1 BOTTLE				

Marketing Information					
Marketing Application Number or Monograph Marketing Start Marketing End Category Citation Date Date					
unapproved drug other		07/01/1994			

Labeler - JACKS MFG INC (056741838)

Registrant - JACKS MFG INC (056741838)

Establishment					
Name	Address	ID/FEI	Business Operations		
TENDA HORSE PRODUCTS, LLC		137337247	manufacture, api manufacture		

Establishment					
Name	Address	ID/FEI	Business Operations		
Finish Line Horse Products Inc.		057174393	manufacture		

Revised: 12/2021 JACKS MFG INC