

VIVIER SHEER SPF 45- zinc oxide, octocrylene, octinoxate, octisalate lotion
Vivier Pharma, Inc.

Vivier Sheer SPF 45

Drug Facts

Active ingredients (w/w)

Zinc Oxide 9.9% Octocrylene 8% Octinoxate 7.5% Octisalate 5%

Purpose

Sun Protectant

Uses

- Helps prevent sunburn • Sun Protection Factor 45 • If used as directed with other sun protection measures (see Directions), decreases the risk of skin cancer and early skin aging caused by the sun

Warnings

For external use only.

Do not use

on broken skin.

When using this product

avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water.

Stop use and ask a doctor if

rash occurs.

Keep out of reach of children.

If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away.

Directions

Adults and children over 6 months of age: • Apply liberally and evenly 15 minutes before sun exposure • Reapply at least every 2 hours • Use a water resistant sunscreen if swimming or sweating. • Sun Protection Measures: Spending time in the sun increases

your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including: • limit time in the sun, especially from 10 a.m.- 2 p.m.; and • wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses.

Other information

Store at room temperature (15-30°C / 59-86°F).

Inactive ingredients

Behenyl Alcohol, Butylparaben, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, C12-15 Alkyl Benzoate, Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, Cyclohexasiloxane, Cyclopentasiloxane, Ethylparaben, Methylparaben, Phenoxyethanol, Phenyl Trimethicone, Propylparaben, Silica, Tetrasodium EDTA, Tocopherol, Triethoxycaprylylsilane, Water.

Questions?

1 877 484 8437

Package Labeling:90ml



DIN 02437775 | NDC 67226-2845-9

Drug Facts**Active ingredients (w/w)**

Zinc Oxide 9.0%	}	Sun Protectant
Octocrylene 8%		
Octinoxate 7.5%		

Uses • Helps prevent sunburn • Sun Protection Factor 45 • If used as directed with other sun protection measures (see Directions), decreases the risk of skin cancer and early skin aging caused by the sun

Warnings

For external use only.

Do not use on broken skin.

When using this product avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water.

Stop use and ask a doctor if rash occurs.

Keep out of reach of children.

If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away.

Directions Adults and children over 6 months of age:
 • Apply liberally and evenly 15 minutes before sun exposure. • Reapply at least every 2 hours. • Use a water resistant sunscreen if swimming or sweating.
 • Sun Protection Measures: Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including: • limit time in the sun, especially from 10 a.m. - 2 p.m.; and • wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses.

Other information

Store at room temperature (15-30°C / 59-86°F).

Inactive ingredients Behenyl Alcohol, Butylparaben, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, C12-15 Alkyl Benzolate, Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, Cyclohexasiloxane, Cyclopentasiloxane, Ethylparaben, Methylparaben, Phenoxyethanol, Phenyl Trimethicone, Propylparaben, Silica, Tetrasodium EDTA, Tocopherol, Triethoxycaprylylsilane, Water.

Questions ? 1 877 484 8437

THE BEAUTY OF RESULTS®



SHEER
SPF | FPS
45

BROAD SPECTRUM UVA/UVB
SUNSCREEN

ÉCRAN SOLAIRE
À LARGUE SPECTRE UVA/UVB

Info-médicament**Ingédients actifs (p/p)**

Oxyde de Zinc 9,9 %	}	Utilité
Octocrylène 8 %		
Octinoxate 7,5 %		

Utilité

Octoisalate 5 %	}	Écran solaire

Usages

• Aide à prévenir les coups de soleil
 • Facteur de protection solaire 45 • Si le produit est utilisé selon les instructions et avec d'autres mesures de protection contre le soleil (voir les Mode d'emploi), le risque de cancer de la peau et de vieillissement prémature de la peau causé par le soleil est réduit.

Mises en garde

Pour usage externe seulement.

Ne pas utiliser sur une peau éraflée.

Lorsque vous utilisez ce produit éviter tout contact avec les yeux. Le cas échéant, bien rincer avec de l'eau.

Cessez d'utiliser et consultez un médecin si une éruption cutanée se développe.

Garder hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale.

Mode d'emploi Adultes et enfants de plus de 6 mois: • Appliquer abondamment et uniformément 15 minutes avant l'exposition au soleil. • Appliquer de nouveau au moins toutes les 2 heures. • Utiliser un écran solaire résistant à l'eau lors d'une activité aquatique ou s'il y a transpiration. • Mesures de protection contre le soleil: Passer du temps au soleil augmente le risque de cancer de la peau et du vieillissement prémature de la peau. Afin de diminuer ce risque, il convient d'utiliser régulièrement un écran solaire avec un F.P.S. à large spectre d'au moins 15 et d'appliquer d'autres mesures de protection contre le soleil, telles que: • limiter le temps passé au soleil, notamment entre 10h - 14h; et • porter des chemises à manches longues, des pantalons, un chapeau et des lunettes de soleil.

Autres renseignements Conserver à la température ambiante (15-30 °C / 59-86 °F).

Ingédients inactifs Behenyl Alcohol, Butylparaben, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, C12-15 Alkyl Benzolate, Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, Cyclohexasiloxane, Cyclopentasiloxane, Ethylparaben, Methylparaben, Phenoxyethanol, Phenyl Trimethicone, Propylparaben, Silica, Tetrasodium EDTA, Tocopherol, Triethoxycaprylylsilane, Eau.

Questions ? 1 877 484 8437

LA BEAUTÉ DES RÉSULTATS®



Vivier Canada Inc. | Mfd. for Vivier Pharma
Vaudreuil-Dorion QC Canada J7V 5V5
Champlain NY USA 12919
viverskin.com

Made in Canada

© Vivier Canada Inc. - used under license

07-8085-01009



Lot XXXXX
EXP YYYY-MM



6 96163 80085 6

WITH ANTIOXIDANTS
TO DIMINISH SIGNS OF AGINGAVEC ANTIOXYDANTS POUR
DIMINUER LES SIGNES DE
VIEILLESSE

90 ml | 3 fl oz

DIN 0243775 | NDC 67226-2845-9



VIVIER®

SHEER
SPF | FPS
45

BROAD SPECTRUM UVA/UVB
SUNSCREEN

ÉCRAN SOLAIRE
À LARGE SPECTRE UVA/UVB

WITH ANTIOXIDANTS
TO DIMINISH SIGNS OF AGING

AVEC ANTIOXYDANTS POUR DIMINUER
LES SIGNES DE VIEILLESSE

90 ml | 3 fl oz

Directions

Adults and children over 6 months of age: Apply liberally and evenly before 15 minutes before sun exposure. Reapply at least every 2 hours.

Warnings

For external use only. Do not use on broken skin. Keep out of reach of children. If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away.

Please see outer container for complete drug facts information.

Other information

Store at room temperature (15-30°C / 59-86°F).

Active ingredients (w/w)

Ingédients actifs (p/p)

Zinc Oxide 9.9% /
Oxyde de Zinc 9,9 %
Octocrylene 8%
Octinoxate 7.5%
Octisalate 5%

Mode d'emploi

Adultes et enfants de plus de 6 mois : Appliquer abondamment et uniformément 15 minutes avant l'exposition au soleil. Appliquer de nouveau au moins toutes les 2 heures.

Mises en garde

Pour usage externe seulement. Ne pas utiliser sur une peau éraflée. Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale.

Veuillez référer au contenant extérieur pour consulter toute l'information sur le médicament.

Autres renseignements

Conserver à la température ambiante (15-30 °C / 59-86 °F).

Questions?

1 877 484 8437



VIVIER®

Vivier Canada Inc. | Mfd. for Vivier Pharma
Vaudreuil-Dorion QC Canada J7V 5V5
Champlain NY USA 12919
vivierskin.com



Made in Canada
01-8085-01D09

Package Labeling:250ml

DIN 02437775 | NDC 67226-2845-2



ÉCRAN SOLAIRE
À LARGE SPECTRE UVA/UVB

WITH ANTIOXIDANTS
TO DIMINISH SIGNS OF AGING
VEC ANTIOXYDANTS POUR DIMINUER
LES SIGNES DE VIEILLESSE

250 ml | 8.45 fl oz

Drug Facts	
Active ingredients (w/w)	Purpose
Zinc Oxide 9.9%	Sun Protectant
Octocrylene 8%	
Octinoxate 7.5%	
Octisalate 5%	
Uses • Helps prevent sunburn • Sun Protection Factor 45 • If used as directed with other sun protection measures (see Directions), decreases the risk of skin cancer and early skin aging caused by the sun.	
Warnings For external use only. Do not use on broken skin. When using this product avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water. Stop use and ask a doctor if rash occurs. Keep out of reach of children. If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away.	
Directions Adults and children over 6 months of age: • Apply liberally and evenly 15 minutes before sun exposure. • Reapply at least every 2 hours. • Use a water resistant sunscreen if swimming or sweating. • Sun Protection Measures: Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including: limit time in the sun, especially from 10 a.m. - 2 p.m. and wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses.	
Other information Store at room temperature (15-30°C / 59-86°F).	
Inactive ingredients For full list of inactive ingredients, visit vivierskin.com	
Questions? 1 877 484 8437	

THE BEAUTY OF RESULTS®
LA BEAUTÉ DES RÉSULTATS®

Vivier Canada Inc. | Mfd. for Vivier Pharma
Vaudreuil-Dorion QC Canada J7V 5V5
Champlain NY USA 12919
vivierskin.com
Made in Canada
© Vivier Canada Inc. – used under license



Info-médicament	
Ingrédients actifs (p/p)	Utilité
Oxyde de Zinc 9,9 %	Écran solaire
Octocrylène 8 %	
Octinoxate 7,5 %	
Octisalate 5 %	
Usages • Aide à prévenir les coups de soleil • Facteur de protection solaire 45 • Si le produit est utilisé selon les instructions et avec d'autres mesures de protection contre le soleil (voir le Mode d'emploi), le risque de cancer de la peau et de vieillissement prématué de la peau causé par le soleil est réduit.	
Mises en garde Pour usage externe seulement. Ne pas utiliser sur une peau éraflée. Lorsque vous utilisez ce produit éviter tout contact avec les yeux. Le cas échéant, bien rincer avec de l'eau. Cessez d'utiliser et consultez un médecin si une éruption cutanée se développe. Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale.	
Mode d'emploi Adultes et enfants de plus de 6 mois : • Appliquer abondamment et uniformément 15 minutes avant l'exposition au soleil. • Appliquer de nouveau au moins toutes les 2 heures. • Utiliser un écran solaire résistant à l'eau lors d'une activité aquatique ou s'il y a transpiration. • Mesures de protection contre le soleil : Passer du temps au soleil augmente le risque de cancer de la peau et du vieillissement prématué de la peau. Afin de diminuer ce risque, il convient d'utiliser régulièrement un écran solaire avec un F.P.S. à large spectre d'au moins 15 et d'appliquer d'autres mesures de protection contre le soleil, telles que: limiter le temps passé au soleil, notamment entre 10h - 14h et porter des chemises à manches longues, des pantalons, un chapeau et des lunettes de soleil.	
Autres renseignements Conserver à la température ambiante (15-30 °C / 59-86 °F).	
Ingrédients inactifs Pour la liste complète des ingrédients inactifs, visitez vivierskin.com	
Questions? 1 877 484 8437	



Drug Facts

Active ingredients (w/w)

Zinc Oxide 9.9%
Octocrylene 8%
Octinoxate 7.5%
Octisalate 5%

Purpose

Sun Protectant

Uses • Helps prevent sunburn • Sun Protection Factor 45 • If used as directed with other sun protection measures (see Directions), decreases the risk of skin cancer and early skin aging caused by the sun

Warnings

For external use only.

Do not use on broken skin.

When using this product avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water.

Stop use and ask a doctor if rash occurs.

Keep out of reach of children.

If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away.

Directions

Adults and children over 6 months of age:

- Apply liberally and evenly 15 minutes before sun exposure. • Reapply at least every 2 hours. • Use a water resistant sunscreen if swimming or sweating.
- Sun Protection Measures: Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including: • limit time in the sun, especially from 10 a.m. - 2 p.m.; and • wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses.

Other information

Store at room temperature (15-30°C / 59-86°F).

Inactive ingredients Behenyl Alcohol, Butylparaben, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, C12-15 Alkyl Benzoate, Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, Cyclohexasiloxane, Cyclopentasiloxane, Ethylparaben, Methylparaben, Phenoxyethanol, Phenyl Trimethicone, Propylparaben, Silica, Tetrasodium EDTA, Tocopherol, Triethoxycaprylylsilane, Water.

Questions ? 1 877 484 8437

Info-médicament

Ingédients actifs (p/p)

Oxyde de Zinc 9,9 %
Octocrylène 8 %
Octinoxate 7,5 %
Octisalate 5 %

Utilité

Écran solaire

Usages

- Aide à prévenir les coups de soleil
- Facteur de protection solaire 45 • Si le produit est utilisé selon les instructions et avec d'autres mesures de protection contre le soleil (voir les Mode d'emploi), le risque de cancer de la peau et de vieillissement prématûre de la peau causé par le soleil est réduit.

Mises en garde

Pour usage externe seulement.

Ne pas utiliser sur une peau éraflée.

Lorsque vous utilisez ce produit éviter tout contact avec les yeux. Le cas échéant, bien rincer avec de l'eau.

Cessez d'utiliser et consultez un médecin si une éruption cutanée se développe.

Garder hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale.

Mode d'emploi

Adultes et enfants de plus de 6 mois: • Appliquer abondamment et uniformément 15 minutes avant l'exposition au soleil. • Appliquer de nouveau au moins toutes les 2 heures. • Utiliser un écran solaire résistant à l'eau lors d'une activité aquatique ou s'il y a transpiration. • Mesures de protection contre le soleil: Passer du temps au soleil augmente le risque de cancer de la peau et du vieillissement prématûre de la peau. Afin de diminuer ce risque, il convient d'utiliser régulièrement un écran solaire avec un F.P.S. à large spectre d'au moins 15 et d'appliquer d'autres mesures de protection contre le soleil, telles que : • limiter le temps passé au soleil, notamment entre 10h - 14h; et • porter des chemises à manches longues, des pantalons, un chapeau et des lunettes de soleil.

Autres renseignements Conserver à la température ambiante (15-30 °C / 59-86 °F).

Ingédients inactifs Behenyl Alcohol, Butylparaben, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, C12-15 Alkyl Benzoate, Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, Cyclohexasiloxane, Cyclopentasiloxane, Ethylparaben, Methylparaben, Phenoxyethanol, Phenyl Trimethicone, Propylparaben, Silica, Tetrasodium EDTA, Tocopherol, Triethoxycaprylylsilane, Eau.

Questions ? 1 877 484 8437

VIVIER SHEER SPF 45

zinc oxide, octocrylene, octinoxate, octisalate lotion

Product Information

Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (Source)	NDC:67226-2852
Route of Administration	TOPICAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
ZINC OXIDE (UNII: SOI2LOH54Z) (ZINC CATION - UNII:13S1S8SF37)	ZINC CATION	99 mg in 1 mL
OCTOCRYLENE (UNII: 5A68WGF6WM) (OCTOCRYLENE - UNII:5A68WGF6WM)	OCTOCRYLENE	80 mg in 1 mL
OCTINOXATE (UNII: 4Y5P7MUD51) (OCTINOXATE - UNII:4Y5P7MUD51)	OCTINOXATE	75 mg in 1 mL
OCTISALATE (UNII: 4X49Y0596W) (OCTISALATE - UNII:4X49Y0596W)	OCTISALATE	50 mg in 1 mL

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
DOCOSANOL (UNII: 9G1OE216XY)	
BUTYLPARABEN (UNII: 3QPI1U3FV8)	
SHEA BUTTER (UNII: K49155WL9Y)	
ALKYL (C12-15) BENZOATE (UNII: A9EJ3J61HQ)	
POLYOXYL 20 CETOSTEARYL ETHER (UNII: YRC528SWUY)	
CETOSTEARYL ALCOHOL (UNII: 2DMT128M1S)	
CYCLOMETHICONE 6 (UNII: XHK3U310BA)	
CYCLOMETHICONE 5 (UNII: 0THT5PCI0R)	
ETHYLPARABEN (UNII: 14255EXE39)	
METHYLPARABEN (UNII: A2I8C7HI9T)	
PHENOXYETHANOL (UNII: HIE492ZZ3T)	
PHENYL TRIMETHICONE (UNII: DR0K5NOJ4R)	
PROPYLPARABEN (UNII: Z8IX2SC1OH)	
SILICON DIOXIDE (UNII: ETJ7Z6XBU4)	
EDETADE SODIUM (UNII: MP1J8420LU)	
TOCOPHEROL (UNII: R0ZB2556P8)	
TRIETHOXCAPRYLYLSILANE (UNII: LDC331P08E)	
WATER (UNII: 059QF0KO0R)	

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:67226-2852-0	1 in 1 CARTON	01/05/2023	
1		90 mL in 1 TUBE; Type 0: Not a Combination Product		
2	NDC:67226-2852-1	1 in 1 CARTON	01/05/2023	
2		250 mL in 1 TUBE; Type 0: Not a Combination Product		

Marketing Information

Marketing	Application Number or Monograph	Marketing Start	Marketing End
-----------	---------------------------------	-----------------	---------------

Category	Citation	Date	Date
OTC Monograph Drug	M020	01/05/2023	

Labeler - Vivier Pharma, Inc. (250996550)

Revised: 10/2023

Vivier Pharma, Inc.