

SHEER BROAD SPECTRUM SPF45- zinc oxide, octocrylene, octinoxate, octisalate lotion
Vivier Pharma Inc.

Sheer Broad Spectrum SPF45

DRUG FACTS

ACTIVE INGREDIENTS

9.9% Zinc Oxide
8.0% Octocrylene
7.5% Ethylhexyl Methoxycinnamate
5.0% Ethylhexyl Salicylate

PURPOSE

Sunscreen

USES

- Helps prevent sunburn and provides a sun protection factor of 45.
- Ideal for daily use; can be applied under makeup.

For external use only

• The sun may cause sunburn, premature aging of the skin and skin cancer. Avoiding the sun, wearing protective clothing and regular use of sunscreens over the years may reduce the chance of these harmful effects.

When using this product

- Avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water.
- Do not use on damaged or broken skin.

Stop use and ask a doctor if

- Rash or irritation develops and lasts.

Keep out of reach of children.

If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

DIRECTIONS

- Apply daily to face, neck and chest.
- Apply liberally and evenly 15 minutes before sun exposure.
- Reapply at least every 2 hours or as needed after towel drying, perspiring heavily or

washing.

- For use on children less than 6 months of age, consult a healthcare practitioner.
- Use a water resistant sunscreen if swimming or sweating.

Store at room temperature (15-30°C / 59-86°F).

INACTIVE INGREDIENTS

BEHENYL ALCOHOL, BUTYLPARABEN, BUTYROSPERMUM PARKII, C12-15 ALKYL BENZOATE, CETEARETH-20, CETEARYL ALCOHOL, CYCLOPENTASILOXANE, CYCLOTETRAISILOXANE, ETHYLPARABEN, METHYLPARABEN, PHENOXYETHANOL, PHENYL TRIMETHICONE, PROPYLPARABEN, SILICA, TETRASODIUM EDTA, TOCOPHERYL ACETATE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, WATER/EAU.

Questions?

450 455 9779

1 877 484 8437

Product Labels

NDC 67226-2845-9

Vivierskin®

SHEER

BROAD SPECTRUM SPF 45
WITH TRANSPARENT
ZINC OXIDE

À LARGE SPECTRE FPS 45
AVEC OXYDE DE ZINC
TRANSPARENT

ALL SKIN TYPES
TOUS TYPES DE PEAU

LOTION

90 mL / 3 fl oz

DIN 02 437775

INDICATION

Helps prevent sunburn and provides a sun protection factor of 45. Ideal for daily use; can be applied under makeup.

DIRECTIONS

Apply daily to face, neck and chest. Apply liberally and evenly 15 minutes prior to sun exposure. Reapply at least every 2 hours or as needed after towel drying, perspiring heavily or washing. Use a water resistant sunscreen if swimming or sweating. For use on children less than 6 months of age, consult a healthcare practitioner.

PRECAUTIONS

For external use only. Do not use on damaged or broken skin. If rash occurs, discontinue use and consult a health care practitioner. When using this product keep out of eyes. Rinse with water to remove. Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away. The sun may cause sunburn, premature aging of the skin and skin cancer. Avoiding the sun, wearing protective clothing and regular use of sunscreens over the years may reduce the chance of these harmful effects. Oil-free. Fragrance-free.

INDICATION

Aident à prévenir les coups de soleil et offre un facteur de protection solaire de 45. Idéal pour utilisation quotidienne; peut être utilisé sous le maquillage.

MODE D'EMPLOI

Appliquer quotidiennement au visage, cou et décolleté. Appliquer abondamment et uniformément 15 minutes avant une exposition au soleil. Appliquer de nouveau au moins toutes les 2 heures ou au besoin après la baignade, le séchage à la serviette, après avoir transpiré abondamment ou après le bain. Utiliser un écran solaire résistant à l'eau lors d'une activité aquatique ou s'il y a transpiration. Consulter un médecin avant d'utiliser sur un enfant de moins de 6 mois.

PRÉCAUTIONS

Pour usage externe seulement. Ne pas utiliser sur la peau endommagée ou présentant des lésions. En présence d'une éruption cutanée, cesser l'utilisation et consulter un professionnel de la santé. Éviter tout contact avec les yeux. Rincer à l'eau le cas échéant. Garder hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter un médecin immédiatement ou appeler un centre antipoison. Le soleil peut causer des coups de soleil, un vieillissement prématuré de la peau et le cancer de la peau. Le fait d'éviter l'exposition au soleil, le port de vêtements protecteurs et l'usage régulier d'écrans solaires peut, avec les années, réduire le risque de ces effets nocifs. Sans huile. Sans parfum.

ACTIVE INGREDIENTS (w/w) / INGRÉDIENTS ACTIFS (p/p)

- 9.9% Zinc Oxide
- 8.0% Octocrylene
- 7.5% Ethylhexyl Methoxycinnamate
- 5.0% Ethylhexyl Salicylate

Vivier Canada Inc.
Mfd. for Vivier Pharma
Hudson QC Canada J0P 1H0
Champlain NY 12919
Made in Canada
vivierpharma.com

© Vivier Canada Inc. – used under license

01-8925-01D10

DRUG FACTS CONTINUED

INACTIVE INGREDIENTS / INGRÉDIENTS INACTIFS: BEHENYL ALCOHOL, BUTYLPARABEN, BUTYROSPERMUM PARKII, C12-15 ALKYL BENZOATE, CETEARETH-20, CETEARYL ALCOHOL, CYCLOPENTASILOXANE, CYCLOTETRAASILOXANE, ETHYLPARABEN, METHYLPARABEN, PHENOXYETHANOL, PHENYL TRIMETHICONE, PROPYLPARABEN, SILICA, TETRASODIUM EDTA, TOCOPHERYL ACETATE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, WATER/EAU.

Questions?
450 455 9779 1 877 484 8437

DRUG FACTS

ACTIVE INGREDIENTS.....PURPOSE

- 9.9% Zinc Oxide..... Sunscreen
- 8.0% Octocrylene..... Sunscreen
- 7.5% Ethylhexyl Methoxycinnamate..... Sunscreen
- 5.0% Ethylhexyl Salicylate..... Sunscreen

USES

- Helps prevent sunburn and provides a sun protection factor of 45.
- Ideal for daily use; can be applied under makeup.

WARNINGS

For external use only

- The sun may cause sunburn, premature aging of the skin and skin cancer. Avoiding the sun, wearing protective clothing and regular use of sunscreens over the years may reduce the chance of these harmful effects.

When using this product

- Avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water.
- Do not use on damaged or broken skin.

Stop use and ask a doctor if

- Rash or irritation develops and lasts.

Keep out of reach of children

If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

DIRECTIONS

- Apply daily to face, neck and chest.
- Apply liberally and evenly 15 minutes before sun exposure.
- Reapply at least every 2 hours or as needed after towel drying, perspiring heavily or washing.
- For use on children less than 6 months of age, consult a healthcare practitioner.
- Use a water resistant sunscreen if swimming or sweating.

Store at room temperature (15-30 °C / 59-86 °F).
Oil free. Fragrance-free.



SHEER

BROAD SPECTRUM SPF 45
WITH TRANSPARENT
ZINC OXIDE

À LARGE SPECTRE FPS 45
AVEC OXYDE DE ZINC
TRANSPARENT

ALL SKIN TYPES
TOUS TYPES DE PEAU

LOTION

90 mL
3 fl oz

INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES

INGRÉDIENTS ACTIFS.....OBJECTIF

- 9.9 % Zinc Oxyde.....Écran solaire
- 8.0 % Octocrylene.....Écran solaire
- 7.5 % Ethylhexyl Methoxycinnamate.....Écran solaire
- 5.0 % Ethylhexyl Salicylate.....Écran solaire

INDICATIONS

- Aident à prévenir les coups de soleil et offre un facteur de protection solaire de 45.
- Idéal pour utilisation quotidienne; peut être utilisé sous le maquillage.

PRÉCAUTIONS

Pour usage externe seulement

- Le soleil peut causer des coups de soleil, un vieillissement prématuré de la peau et le cancer de la peau. Le fait d'éviter l'exposition au soleil, le port de vêtements protecteurs et l'usage régulier d'écrans solaires peut, avec les années, réduire le risque de ces effets nocifs.

Durant l'application de ce produit

- Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, bien vous les rincer avec de l'eau.
- Ne pas utiliser sur la peau endommagée ou présentant des lésions.

Cessez l'utilisation et demandez l'avis d'un médecin si

- Irritations ou éruptions apparaissent.

Garder hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, obtenez des soins médicaux ou appelez immédiatement un Centre anti-poison.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer quotidiennement au visage, cou et décolleté.
- Appliquer abondamment et uniformément 15 minutes avant l'exposition au soleil.
- Appliquer de nouveau au moins toutes les 2 heures ou au besoin après la baignade, le séchage à la serviette, après avoir transpiré abondamment ou après le bain.
- Consulter un médecin avant d'utiliser sur un enfant de moins de 6 mois.
- Utiliser un écran solaire résistant à l'eau lors d'une activité aquatique où s'il y a transpiration.

Questions ?

450 455 9779 1 877 484 8437

Conservé à température ambiante (15-30 °C / 59-86 °F).
Sans huile. Sans parfum.

Vivier PHARMA
Vivier Canada Inc.
Mfd. for Vivier Pharma
Hudson QC Canada J0P 1H0
Champlain NY USA 12919
Made in Canada
vivierpharma.com

© Vivier Canada Inc. — used under license

07-8825-D1011



DIN 0243775

250mL Packaging

DIN 02437775 | NDC 67226-2845-2



SHEER

BROAD SPECTRUM SPF 45 LOTION
WITH TRANSPARENT
ZINC OXIDE

LOTION À LARGE SPECTRE FPS 45
AVEC OXYDE DE ZINC
TRANSPARENT

PROFESSIONAL USE ONLY
USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT

250 ml | 8.45 fl oz

Drug facts		
Active ingredients	Purpose	
Zinc Oxide 9.9% Octocrylene 8.0% Ethylhexyl Methoxycinnamate 7.5% Ethylhexyl Salicylate 5.0%	} Sunscreen	
Uses •Helps prevent sunburn and provides a sun protection factor of 45. •Ideal for daily use; can be applied under makeup.		
Warnings For external use only. The sun may cause sunburn, premature aging of the skin and skin cancer. Avoiding the sun, wearing protective clothing and regular use of sunscreens over the years may reduce the chance of these harmful effects. When using this product •Avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water. •Do not use on damaged or broken skin. Stop use and ask a doctor if rash or irritation develops and lasts. Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.		
Directions •Apply daily to face, neck and chest. •Apply liberally and evenly 15 minutes before sun exposure. •Reapply at least every 2 hours or as needed after towel drying, perspiring heavily or washing. •For use on children less than 6 months of age, consult a healthcare practitioner. •Use a water resistant sunscreen if swimming or sweating.		
Other information Store at room temperature (15-30°C / 59-86°F).		
Inactive ingredients Behenyl Alcohol, Butylparaben, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), C12-15 Alkyl Benzoate, Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, Cyclohexasiloxane, Cyclopentasiloxane, Ethylparaben, Methylparaben, Phenoxyethanol, Phenyl Trimethicone, Propylparaben, Silica, Tetrasodium EDTA, Tocopherol, Triethoxycaprylsilane, Water.		
Questions? Call 1 877 484 8437		

Oil-free
Fragrance-free
Recommended by physicians

THE BEAUTY OF RESULTS™



Vivier Canada Inc. | Mfd. for Vivier Pharma
Vaudreuil-Dorion QC Canada J7V 5V5
Champlain NY USA 12919
vivierskin.com
Made in Canada

©/ TM Vivier Canada Inc. - used under license 01-8925P-05



Informations pharmaceutiques		
Ingrédients actifs	Utilité	
Oxyde de Zinc 9.9% Octocrylene 8.0% Ethylhexyl Methoxycinnamate 7.5% Ethylhexyl Salicylate 5.0%	} Ecran solaire	
Usages •Aide à prévenir les coups de soleil et offre un facteur de protection solaire de 45. •Idéal pour utilisation quotidienne; peut être utilisé sous le maquillage.		
Mises en garde Pour usage externe seulement. Le soleil peut causer des coups de soleil, un vieillissement prématuré de la peau et le cancer de la peau. Le fait d'éviter l'exposition au soleil, le port de vêtements protecteurs et l'usage régulier d'écrans solaires peut, avec les années, réduire le risque de ces effets nocifs. Lorsque vous utilisez ce produit •Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, bien vous les rincer avec de l'eau. •Ne pas utiliser sur la peau endommagée ou présentant des lésions. Cesser l'utilisation et demander l'avis d'un médecin si irritations ou éruptions apparaissent. Garder hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, obtenir des soins médicaux ou appeler immédiatement un Centre anti-poison.		
Mode d'emploi •Appliquer quotidiennement au visage, cou et décolleté. •Appliquer abondamment et uniformément 15 minutes avant l'exposition au soleil. •Appliquer de nouveau au moins toutes les 2 heures ou au besoin après la baignade, le séchage à la serviette, après avoir transpiré abondamment ou après le bain. •Consulter un médecin avant d'utiliser sur un enfant de moins de 6 mois. •Utiliser un écran solaire résistant à l'eau lors d'une activité aquatique ou s'il y a transpiration.		
Autre renseignement Conserver à la température ambiante (15-30 °C / 59-86 °F).		
Ingrédients inactifs Behenyl Alcohol, Butylparaben, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), C12-15 Alkyl Benzoate, Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, Cyclohexasiloxane, Cyclopentasiloxane, Ethylparaben, Methylparaben, Phenoxyethanol, Phenyl Trimethicone, Propylparaben, Silica, Tetrasodium EDTA, Tocopherol, Triethoxycaprylsilane, Eau.		
Questions ? Composez le 1 877 484 8437		

Sans huile
Sans parfum
Recommandé par les médecins

LA BEAUTÉ DES RÉSULTATS™



SHEER BROAD SPECTRUM SPF45

zinc oxide, octocrylene, octinoxate, octisalate lotion

Product Information

Product Type

HUMAN OTC DRUG

Item Code (Source)

NDC:67226-2845

Route of Administration TOPICAL

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
ZINC OXIDE (UNII: SOI2LOH54Z) (ZINC CATION - UNII:13S1S8SF37)	ZINC CATION	99 mg in 1 mL
OCTOCRYLENE (UNII: 5A68WGF6WM) (OCTOCRYLENE - UNII:5A68WGF6WM)	OCTOCRYLENE	80 mg in 1 mL
OCTINOXATE (UNII: 4Y5P7MUD51) (OCTINOXATE - UNII:4Y5P7MUD51)	OCTINOXATE	75 mg in 1 mL
OCTISALATE (UNII: 4X49Y0596W) (OCTISALATE - UNII:4X49Y0596W)	OCTISALATE	50 mg in 1 mL

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
POLYOXYL 20 CETOSTEARYL ETHER (UNII: YRC528SWUY)	
CETOSTEARYL ALCOHOL (UNII: 2DMT128M1S)	
CYCLOMETHICONE 5 (UNII: 0THT5PCI0R)	
CYCLOMETHICONE 4 (UNII: CZ227117JE)	
ETHYLPARABEN (UNII: 14255EXE39)	
METHYLPARABEN (UNII: A2I8C7HI9T)	
PHENOXYETHANOL (UNII: HIE492ZZ3T)	
PHENYL TRIMETHICONE (UNII: DR0K5NOJ4R)	
DOCOSANOL (UNII: 9G1OE216XY)	
BUTYLPARABEN (UNII: 3QPI1U3FV8)	
ALKYL (C12-15) BENZOATE (UNII: A9EJ3J61HQ)	
PROPYLPARABEN (UNII: Z8IX2SC1OH)	
SILICON DIOXIDE (UNII: ETJ7Z6XBU4)	
EDETATE SODIUM (UNII: MP1J8420LU)	
.ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE (UNII: 9E8X80D2L0)	
TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE (UNII: LDC331P08E)	
WATER (UNII: 059QF0KO0R)	

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:67226-2845-9	1 in 1 CARTON	05/14/2015	09/30/2026
1		90 mL in 1 BOTTLE; Type 0: Not a Combination Product		
2	NDC:67226-2845-2	250 mL in 1 TUBE; Type 0: Not a Combination Product	05/14/2015	03/31/2026
3	NDC:67226-2845-4	1 in 1 CARTON	05/14/2015	06/01/2017
3		4 mL in 1 TUBE; Type 0: Not a Combination Product		

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
--------------------	--	----------------------	--------------------

OTC Monograph Drug M020

05/14/2015

09/30/2026

Labeler - Vivier Pharma Inc. (250996550)

Revised: 4/2025

Vivier Pharma Inc.