# MAXCLINIC MIRACLINIC CONTOUR ING OBJECT- niacinamide, adenosine patch N&B LAB.Co.Ltd

Disclaimer: This drug has not been found by FDA to be safe and effective, and this labeling has not been approved by FDA. For further information about unapproved drugs, click here.

-----

#### **ACTIVE INGREDIENT**

Active Ingredient: Niacinamide 2.0%, Adenosine 0.04%

#### **INACTIVE INGREDIENT**

Inactive Ingredients: Water, Methylpropanediol, Glycerin, Glycereth-26, Panthenol, Carbomer, Trehalose, Erythritol, Hydroxyethylcellulose

#### PURPOSE

Purpose: Skin Protectant

#### WARNINGS

Warnings: For external use only. When using this product Keep out of eyes, Rinse with water to remove. Stop use and ask a doctor if Rash or irritation develops and lasts, Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

#### **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

#### KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

#### **INDICATIONS & USAGE**

Indications & usage: 1. Take out top part of MIRACLINIC ampoule dressing(no.1) and place it up aligning holes with eyes. 2. Take out lower part of ampoule dressing(no.1) place it aligning hole with lips, and over jaw line by holding it up (Adheres better when pulling it up since material is stretchy) 3. Take out lower part of ampoule dressing(no.1) place it aligning hole with lips, and over jaw line by holding it up (Adheres better when pulling hole with lips, and over jaw line by holding it upm (Adheres better when pulling it up since material is stretchy) 4. Take out countouring object(no,2) and place from forehead, cheeks and mouth area slowing on top of ampoule dressing. 5. Adhere jaw area mask by pulling it up along facial line. 6. Gently press face with both hands supporting facial line. Adheres better if plaster is pressed till moist. 7. Take off plaster once tapping and checking plaster on cheecks is hardened after 20~30 minutes. 8. Take off the mask sheet. Remove remaining plaster from the face and finish with applying essence.

#### **DOSAGE & ADMINISTRATION**

Dosage & Administration: Take an adequate amount of this product. Use twice a day(morning & night).

#### PACKAGE LABEL.PRINCIPAL DISPLAY PANEL





[전성분] 경제수, 메칠프로판다울, 알리세린, 나이아신아마이드, 알리세레스-26, 세라마이드엔페, 소통하이일루로네이트, 몰악오일, 하이드롤라이즈드끌라겐, 하이드롤라이즈드엘라스틴, 이르킨트리커넬오일, 쉐아버티, 호호바씨오일, 로즈한열메오일, 빅사씨오일, 코코넷오일, 판태농, 트레함로스, 하이드로제네이티드레시틴, 피리독신에이치씨엘, 토코패플에세테이트, 칼술 팬트타네이트, 에리스리몰, 소통아스고빌포스페이트, 토코퍼플, 맥틱아씨드, 글라아신, 세란, 클루라아씨드, 아스파릭하씨드, 유신, 플레스테를, 부틸란클라이플, 카드릴릭/카프릭트리콜 리세라이드, 히스티딘, 프롤리, 패날알라닌, 트레오닌, 타이르신, 이소류산, 알라난, 일라난, 시스테인, 메치오난, 라아신, 소통스타치옥테날섹세이이트, 발토텍스트린, 카보머, 콜리페 출십세스키옥산, 실리카, 새상씨추출물, 아테노신, 일란토인, 페이지-14세, 하이드루시에칠셀플로오스, 동오일, 해비타카씨오일, 티타뇽디옥사이드, 비스-페이카-18배칠에데이철실관, 디소등이디티데이이, 플라글푸라마에씨드, 페이지/피피지-11/6코플리미, 트로메타인, 페이지~60하이드로제네이비드카스타오일, 에칠백실교리세린, 에실백신다울, 1,2~백신다을, 향료

[사용 시의 주의사항] 1. 화장품을 사용하여 다음과 같은 이상이 있는 경우에는 사용을 중지하여야 하며, 계속 사용하면 증상이 악하되므로 피부과 전문의 통에게 상담할 것, 가. 사용증 붉은 반형, 부여오름, 가려움증, 자득 등의 이상이 있는 경우, 나, 작용 부위가 직사광선에 의하여 위와 같은 이상이 있는 경우, 2. 상사가 있는 부위, 습진 및 피부형 등의 이상이 있는 위에는 사용을 하지 말 것, 3. 보관 및 취급 시의 주의사항, 가. 사용 후에는 반드시 미개를 닫아들 것, 나, 유아 · 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것, 다. 고온 또는 저온의 장소 및 직사광선이 많는 곳에는 보관하지 말 것, \*<u>눈 주위를</u> 피하여 사용할 것, \*<u>눈에 들어갔을 때는 깨끗한 물로 씻을 것</u> \* 본래의 용도 이와에는 사용하지 마십시오, \* 본 제품은 일회용이므로 사용 후 폐기해 주십시오.

[ 효 능 효 과 ] 피부의 주름개선에 도움을 줍니다. 피부의 미백에 도움을 줍니다.

[응 법 응 당 / 분들을 피부에 붙이고 10~20분 후 지지제를 제거한 다음 남은 제품을 즐고루 패바릅니다. [제조판매업과 ] (주)연판비원 서울시 서초구 남부순환로 2423, 8층 (서초동, 한원빌딩) [제조판매업 및 사용기한] 별도표시

Miraclinic **Contouring Object** 맥스클리닉 미라클리닉 컨투어링 오브제

[호동성분] 아테노신, 나이아신아마이드 [용 량] 36 ml (1회용) [제 조 업 자] (주)엔크스 경기도 오상시 가장산업동료 14-12

[판 매 원](주)엔앤비랩 서울시 서오구 남부순황로 2423, 8층 (서오등, 한원발딩)



본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 '소비자분쟁해결기준'에 의해 보상 또는 교환해 드립니다. 소비자 상담실 : 1566-2945

[사용 시의 주의사항] 1, 본 제품을 사용하여 다음과 같은 이상이 있는 경우에는 사용을 중지하여야 하며, 계속 사용하면 증상이 약화되므로 피부과 전문의 등에게 상담할 것, 가, 사용 중 붉은 반접, 부어오름, 가려움증, 자극 등의 이상이 있는 경우, 나, 적용 부위가 직사광선에 의하여 위와 같은 이상이 있는 경우, 2, 상처가 있는 부위, 습진 및 피부엽 등의 이상이 있는 부위 에는 사용을 하지 말 것, 3, 보관 및 취급 시의 주의사항, 가, 본 제품은 일회용이므로 사용 후 폐기할 것, 나, 유아·소이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것, 다, 고은 또는 저온의 장소 및 직 사망선이 닿는 곳에는 보관하지 말 것, \* 눈 주위를 피하여 사용할 것, \* 눈에 들어갔을 때는 깨끗한 물론 셋을 것.

[재

질]부직포(면)

[제조번호 및 사용기한 ] 별도표시

\* 소재 특성 상 가루 떨어짐이 있을 수 있으니 세계 흔들거나 구기지 말 것, \* 본래의 용도 이외에는 사용하지 마십시오.

#### [품질표시사항]

- [주 성 분]칼슘설페이트
- [중 광]24g(지지체포함)

[제 조 원] 녹산양행주식회사 충청북도 충주시 양성면 양암로 610

[Active Ingredients ] Niacinamide 2.0%, Adenosine 0.04%

Active ingredients J Macinamide 2.0%, Adendante 0.04%

[INGREDIENTS] Water, Methylpropanediol, Glycerin, Glycereth-26, Panthenol, Carbomer, Trehalose, Erythritol, Hydroxyethylcellulose [PURPOSE] Skin Protectant

[WARNINGS] For external use only. When using this product Keep out of eyes, Rinse with water to remove. Stop use and ask a doctor if Rash or irritation develops and lasts, Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

[Indications & usage ] 1. Take out top part of MIRACLINIC ampoule dressing(no.1) and place it up aligning holes with eyes. 2. Take out lower part of ampoule dressing (no.1) place it aligning hole with lips, and over jaw line by holding it up (Adheres better when pulling it up since material is stretchy) 3. Take out lower part of ampoule dressing(no.1) place it aligning hole with lips, and over jaw line by holding it up (Adheres better when pulling it up since material is stretchy) 4. Take out countouring object(no.2) and place from forehead, cheeks and mouth area slowing on top of ampoule dressing. 5. Adhere jaw area mask by pulling it up along facial line. 6. Gently press face with both hands supporting facial line. Supporting facial line. Adheres better if plaster is pressed till moist.

Take off plaster once tapping and checking plaster on cheecks is hardened after 20~30 minutes. 8. Take off the
mask sheet. Remove remaining plaster from the face and finish with applying essence.
 [DOSAGE & ADMINISTRATION ] Take an adequate amount of this product. Use twice a day(morning & night).

[ MANUFACTURING DEALERS ] N&B Lab Co.,Ltd.

Made in Korea

www.maxclinic.com



**NV%CLINIC** 

## MAXCLINIC MIRACLINIC CONTOUR ING OBJECT



# for the sustainable beauty

<b>Product Informat</b>	ion						
Product T ype		HUMAN OTC DRUG	Item Code (	tem Code (Source)		NDC:69058-200	
Route of Administra	tion	TOPICAL					
Active Ingradient	Active Moi	a faz					
Active Ingredient/Active Moiety Ingredient Name Basis of Stre					ngth Strength		
Niacinamide (UNII: 25X51I8 RD4) (NIACINAMIDE - UNII:25X51I8 RD4) Niacinamide						48 g in 24 g	
Adenosine(UNII: K72T3FS567) (ADENOSINE - UNII:K72T3FS567)Adenosine						009 g in 24 g	
Inactive Ingredients Ingredient Name						Strength	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						Strength	
Water (UNII: 059QF0K	O0R)						
Methylpropanediol (UNII: N8F53B3R4R)							
Packaging							
00		Package Description	Mar	keting Start Date	Marke	ting End Dat	
# Item Code		<b>č</b>		<b>rketing Start Date</b> /2016	Marke	ting End Dat	
Item Code           NDC:69058-200-02	1 in 1 CARTON	<b>č</b>	11/01	0	Marke	ting End Dat	
#         Item Code           1         NDC:69058-200-02	1 in 1 CARTON		11/01	0	Marke	ting End Dat	
Item Code           NDC:69058-200-02	1 in 1 CARTON		11/01	0	Marke	ting End Dat	
Item Code           NDC:69058-200-02           NDC:69058-200-01	1 in 1 CARTON 24 g in 1 POUC		11/01	0	Marke	ting End Dat	
1 NDC:69058-200-02	1 in 1 CARTON 24 g in 1 POUC		oduct	0		ting End Dat	

# Labeler - N&B LAB.Co.Ltd (690332858)

## Registrant - N&B LAB.Co.Ltd (690332858)

Establishment							
Name	Address	ID/FEI	Business Operations				
N&B LAB.Co.Ltd		690332858	manufacture(69058-200)				

Revised: 12/2016

N&B LAB.Co.Ltd