

TYLAN 40 SULFA-G- tylosin phosphate and sulfamethazine granule
Elanco US Inc.

Package/Label Principal Display Panel

Tylan™ 40 Sulfa G

TM

Net Weight **50 lbs**
(22.68 kg)

Tylosin Phosphate and Sulfamethazine (INN: Sulfadimidine) Elliptical Pellets

For Use In Swine Feeds Only

Do Not Feed Undiluted.

For maintaining weight gains and feed efficiency in the presence of atrophic rhinitis; prevention of swine dysentery (vibriotic); control of swine pneumonias caused by bacterial pathogens (*Pasteurella multocida* and/or *Actinomyces pyogenes*)

Important: Must be Thoroughly Mixed in Feeds Before Use.

Do not use any finished feed (supplement concentrate or complete feed) containing in excess of 2% bentonite.

Active Drug Ingredients:

Tylosin (as tylosin phosphate) 40 g per lb
Sulfamethazine (INN: Sulfadimidine) 8.8% (40 g per lb)

Mixing and Feeding Directions: Thoroughly mix 2.5 pounds Tylan 40 Sulfa G Premix in one ton of complete feed to provide 100 grams of tylosin and 100 grams of sulfamethazine per ton.

Tylan™ 40 ซัลฟา G
Tylan 40 Sulfa G

ส่วนประกอบ ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาไทโอสเฟส (Tylosin phosphate) และซัลฟา-ไดมีดีน (Sulfadimidine) จำนวน 40 กรัม ต่อ 1 ปอนด์ (454 กรัม)

ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับควบคุมโรคทางเดินหายใจในหมู่น้ำหนัก 7 สัปดาห์ขึ้นไป

- รักษาและป้องกันการเกิดโรคในหมู่น้ำหนัก 7 สัปดาห์ขึ้นไป
- ป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในหมู่น้ำหนัก 7 สัปดาห์ขึ้นไป
- ควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในหมู่น้ำหนัก 7 สัปดาห์ขึ้นไป

ข้อควรระวัง ห้ามผสมในนม 40 กรัม ต่อ 1 ลิตร น้ำดื่มสะอาด 15 ลิตร ต่อ 1 ลิตร น้ำดื่ม

ปริมาณการใช้ ให้ผสมในนม 40 กรัม ต่อ 1 ลิตร น้ำดื่มสะอาด 15 ลิตร ต่อ 1 ลิตร น้ำดื่ม

วิธีใช้ ผสมในนม 40 กรัม ต่อ 1 ลิตร น้ำดื่มสะอาด 15 ลิตร ต่อ 1 ลิตร น้ำดื่ม

คำเตือน ห้ามใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะชนิดอื่น

ข้อควรระวัง ห้ามใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะชนิดอื่น

ผู้ผลิต: Elanco Animal Health
บริษัท: Elanco (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพฯ

Tylan, Tylan, Elanco และ Tylosin เป็นเครื่องหมายการค้าของ Elanco หรือบริษัทในเครือ
© 2011 Elanco or its affiliates

WARNING: Feeds containing Tylan 40 Sulfa G Premix must be withdrawn 15 days before swine are slaughtered.

Avoid moisture and excessive heat.

Warning: Tylan 40 Sulfa G may be irritating to unprotected skin and eyes. When mixing and handling Tylan 40 Sulfa G use protective clothing and impervious gloves. In case of accidental eye exposure, flush eyes with plenty of water. Exposed skin should be washed with plenty of soap and water. Remove and wash contaminated clothing. Seek medical attention if irritation becomes severe or persists.

Reg. No. 2F 6/60

ยาควบคุมพิเศษ
ยาสำหรับสัตว์

Manufactured by:
Provimi North America Inc.
6531 State Route 503, Lewisburg, Ohio 45338, USA

Imported by Elanco (Thailand) Ltd., Bangkok

YL103049X

TYLAN 40 SULFA-G

tylosin phosphate and sulfamethazine granule

Product Information

Product Type	VFD TYPE A MEDICATED ARTICLE ANIMAL DRUG	Item Code (Source)	NDC:58198-0904
Route of Administration	ORAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
TYLOSIN PHOSPHATE (UNII: NR75X12AFF) (TYLOSIN - UNII:YEF4JXN031)	TYLOSIN PHOSPHATE	88 g in 1 kg
SULFAMETHAZINE (UNII: 48U51W007F) (SULFAMETHAZINE - UNII:48U51W007F)	SULFAMETHAZINE	88 g in 1 kg

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:58198-0904-2	22.68 kg in 1 BAG		

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
Export only		12/01/1966	

Labeler - Elanco US Inc. (966985624)

Revised: 8/2024

Elanco US Inc.