

**MULTI-SYMPTOM COLD RELIEF- acetaminophen, dextromethorphan hbr, phenylephrine hcl , guaifenesin, , tablet, film coated
Unifirst First Aid Corporation**

Green Guard Cold Relief

Drug Facts

Active ingredients (in each caplet)

Acetaminophen 325 mg

Dextromethorphan HBr 10 mg

Guaifenesin 100 mg

Phenylephrine HCl 5 mg

Purpose

Pain reliever/fever reducer

Cough suppressant

Expectorant

Nasal decongestant

Uses

Temporarily relieves these symptoms due to the common cold

- headache
- nasal congestion
- cough
- minor aches and pains
- sore throat
- sinus congestion and pressure
- helps loosen phlegm (mucus) and thin bronchial secretions to drain bronchial tubes and make cough more productive

Temporarily reduces fever.

Warnings

Liver warning: This product contains acetaminophen. Severe liver damage may occur if you take:

- more than 4,000 mg of acetaminophen in 24 hours
- with other drugs containing acetaminophen
- 3 or more alcoholic drinks every day while using this product

Allergy alert: Acetaminophen may cause severe skin reactions. Symptoms may include:

- skin reddening
- blisters

- rash

If a skin reaction occurs, stop use and seek medical help right away.

Sore throat warning: If sore throat is severe, persists for more than 2 days, is accompanied or followed by fever, headache, rash, nausea, or vomiting, consult a doctor promptly.

Do not use

- with any other drug containing acetaminophen (prescription or nonprescription). If you are not sure whether a drug contains acetaminophen, ask a doctor or pharmacist.
- if you have ever had an allergic reaction to this product or any of its ingredients
- if you are now taking a prescription monoamine oxidase inhibitor (MAOI) (certain drugs for depression, psychiatric or emotional conditions, or Parkinson's disease), or for 2 weeks after stopping the MAOI drug. If you do not know if your prescription drug contains an MAOI, ask a doctor or pharmacist before taking this product.

Ask a doctor before use if you have

- liver disease
- heart disease
- high blood pressure
- thyroid disease
- diabetes
- difficulty in urination due to enlargement of the prostate gland
- cough that occurs with too much phlegm (mucus)
- persistent or chronic cough that lasts as occurs with smoking, asthma, chronic bronchitis, or emphysema

Ask a doctor or pharmacist before use if you are taking the blood thinning drug warfarin.

When using this product do not exceed recommended dosage.

Stop use and ask a doctor if

- nervousness, dizziness, or sleeplessness occur
- pain, cough, or nasal congestion gets worse or lasts more than 7 days
- fever gets worse or lasts more than 3 days
- redness or swelling is present
- new symptoms occur
- cough comes back or occurs with rash or headache that lasts.

These could be signs of a serious condition.

If pregnant or breast-feeding, ask a health professional before use.

Keep out of reach of children.

In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away. Prompt medical attention is critical for adults as well as for children even if you do not notice any signs or symptoms.

Directions

- **do not take more than directed**

Adults and children: (12 years and over)

- take 2 caplets every 4 hours
- not to take more than 10 caplets in 24 hours

Children under 12 years: ask a doctor

Other information

- store at 25°C (77°F); excursions permitted between 15°-30°C (59°-86°F)
- tamper evident sealed packets
- do not use any opened or torn packets

Inactive ingredients corn starch, crospovidone, FD&C yellow # 6 aluminum lake, magnesium stearate, maltodextrin, microcrystalline cellulose, polyethylene glycol, polyvinyl alcohol, povidone, silicon dioxide, sodium starch glycolate, stearic acid, talc, titanium dioxide

Questions or comments? 1-800-869-6970

Multi-Symptom Cold Relief™

Pull to Open

Tire Para Abrir

Acetaminophen / Acetaminofeno 325 mg

Dextromethorphan HBr / Hidrobromuro de dextrometorfano 10 mg

Guaifenesin / Guaifenesina 100 mg

Phenylephrine HCl / Hidrocloruro de fenilefrina 5 mg

Green Guard®

Pain reliever/Fever reducer

Multi-Symptom Relief

Alivia el dolor/Reduce la fiebre

Alivia multisintomas

Distributed by Green Guard®

St Louis, MO 63045

40 Packets of 2 Caplets

80 Caplets

Order #2580

CONSERVE LA CARTA PARA OBTENER LA INFORMACIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO.

Este producto es un medicamento que contiene acetaminofeno y dextrometorfan. No debe ser usado por personas con problemas de hígado o riñón. No debe ser usado por personas que toman alcohol. No debe ser usado por personas que toman otros medicamentos que contienen acetaminofeno. No debe ser usado por personas que toman otros medicamentos que contienen dextrometorfan. No debe ser usado por personas que toman otros medicamentos que contienen fenylephrina. No debe ser usado por personas que toman otros medicamentos que contienen guaifenesina. No debe ser usado por personas que toman otros medicamentos que contienen pseudoefedrina. No debe ser usado por personas que toman otros medicamentos que contienen clorfeniramina. No debe ser usado por personas que toman otros medicamentos que contienen diphenhydramine. No debe ser usado por personas que toman otros medicamentos que contienen doxylamine. No debe ser usado por personas que toman otros medicamentos que contienen promethazine. No debe ser usado por personas que toman otros medicamentos que contienen chlorpheniramine. No debe ser usado por personas que toman otros medicamentos que contienen diphenhydramine. No debe ser usado por personas que toman otros medicamentos que contienen doxylamine. No debe ser usado por personas que toman otros medicamentos que contienen promethazine.

Advertencias

Evite el alcohol. No tome alcohol durante el uso de este medicamento. El alcohol puede aumentar los efectos secundarios de este medicamento. No tome alcohol durante el uso de este medicamento. El alcohol puede aumentar los efectos secundarios de este medicamento. No tome alcohol durante el uso de este medicamento. El alcohol puede aumentar los efectos secundarios de este medicamento.

Usos

Este medicamento es un medicamento que contiene acetaminofeno y dextrometorfan. No debe ser usado por personas con problemas de hígado o riñón. No debe ser usado por personas que toman alcohol. No debe ser usado por personas que toman otros medicamentos que contienen acetaminofeno. No debe ser usado por personas que toman otros medicamentos que contienen dextrometorfan. No debe ser usado por personas que toman otros medicamentos que contienen fenylephrina. No debe ser usado por personas que toman otros medicamentos que contienen guaifenesina. No debe ser usado por personas que toman otros medicamentos que contienen pseudoefedrina. No debe ser usado por personas que toman otros medicamentos que contienen clorfeniramina. No debe ser usado por personas que toman otros medicamentos que contienen diphenhydramine. No debe ser usado por personas que toman otros medicamentos que contienen doxylamine. No debe ser usado por personas que toman otros medicamentos que contienen promethazine.

Información del medicamento (continuación)

Consulte al médico antes de administrarlo si usted tiene:

- enfermedad del hígado
- enfermedad del corazón
- enfermedad de la tiroides
- diabetes
- dificultad al orinar debido al crecimiento de la glándula prostática
- las que se presenta con fiebre excesiva
- las que persiste o es crítica como ocurre al fumar, con el asma o enfiame o con la bronquitis crónica

Consulte con un médico o farmacéuta antes de administrarlo, si usted toma el medicamento warfarin para el adelgazamiento de la sangre.

Al consumir este medicamento no exceda la dosis de consumo recomendada.

Diga de tomar este medicamento y consulte con el médico si:

- si produce náuseas, mareos o dificultad para dormir
- si dolor de la boca, o la congestión nasal empeora o persiste por más de 7 días
- si empeora la fiebre y persiste por más de 3 días
- si presenta enrojecimiento o hinchazón
- si aparecen nuevos síntomas

Si los síntomas se presentan con sarpullido o dolor de cabeza persistentes. Estos pueden ser señales de serios problemas.

Si está embarazada o en periodo de lactancia, consulte la opinión de un médico antes de consumir este producto.

Mantenga este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. En caso de ocurrir una sobredosis, consíguela de inmediato con un médico o llame a un centro de control de envenenamiento (Poison Control Center). La información médica es crítica tanto en adultos como en niños así cuando usted no sabe señalar a sí mismo.

Instrucciones

- no exceda la dosis de consumo recomendada
- tome 2 comprimidos cada 4 horas
- no consuma más de 10 comprimidos en 24 horas

Adultos y niños (de 12 años y mayores) (en cada comprimido o tableta)

Niños menores de 12 años: Consulte al médico

(continúa en la cartilla de información de este medicamento)

Rev. 7/2022, Mfg. 24

Información del medicamento (continuación)

Otra información

- conservarse a temperatura 25°C (77°F); en excursions se permite entre 15°-30°C (59°-86°F)
- empacado con sellado evidente
- no use ningún paquete abierto o roto

Ingredientes Inactivos

amidon de maíz, croscopolona, amarillo FDC #6 lago de aluminio, estearato de magnesio, maltodextrina, celulosa microcristalina, polidimetilsiloxano, alcohol polivinílico, povidona, dióxido de silicio, óxido de zinc, óxido de aluminio, ácido estearico, sales, dióxido de titanio

¿Tiene alguna pregunta o comentario? Llame al 1-800-869-6375

PMS 124

PMS 286

Drug Facts (continued)

Directions

- do not take more than directed
- take 2 capsules every 4 hours
- do not take more than 10 capsules in 24 hours

Adults and Children 12 Years and over

Children under 12 years: ask a doctor

Multi-Symptom Cold relief

Pain reliever/fever reducer
Multi-Symptom Relief

Alivia el dolor/Reduce la fiebre
Alivia múltiples síntomas

Acetaminophen/Acetaminofeno 325 mg
Dextromethorphan Hydrobromide de dextrometorfan 10 mg
Guaifenesin/Guaifenesina 100 mg
Phenylephrine HCl/Hidrocloreto de fenilefrina 5 mg

Phenylephrine: Contiene pseudoefedrina, expectorante, descongestionante

Alivia el dolor, Supresión de la tos, Expectorante, Descongestionante nasal

GREEN GUARD

40 Packets of 2 Caplets
80 Caplets
Order #2580

Drug Facts (continued)

Active ingredient (in each caplet)

Active ingredient	Purpose
Dextromethorphan Hydrobromide 10 mg	Cough suppressant
Dextromethorphan Hydrobromide 10 mg	Cough suppressant
Phenylephrine Hydrochloride 5 mg	Nasal decongestant

Uses

Temporarily relieves these symptoms due to the common cold:

- headache
- nasal congestion
- cough
- minor aches and pains
- sore throat
- sinus congestion and pressure
- helps loosen phlegm (mucus) and ease bronchial secretions to temporarily reduce fever

Warnings

Liver warning: This product contains acetaminophen. Severe liver damage may occur if you take:

- more than 4,000 mg of acetaminophen in 24 hours
- with other drugs containing acetaminophen
- 3 or more alcoholic drinks every day while using this product

MULTI-SYMPTOM COLD RELIEF

acetaminophen, dextromethorphan hbr, phenylephrine hcl , guaifenesin , , tablet, film coated

Product Information			
Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (Source)	NDC:47682-047
Route of Administration	ORAL		

Active Ingredient/Active Moiety			
Ingredient Name	Basis of Strength	Strength	
DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE (UNII: 9D2RT19KYH) (DEXTROMETHORPHAN - UNII:7355X3ROTS)	DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE	10 mg	
GUAIFENESIN (UNII: 495W7451VQ) (GUAIFENESIN - UNII:495W7451VQ)	GUAIFENESIN	100 mg	
ACETAMINOPHEN (UNII: 362O9ITL9D) (ACETAMINOPHEN - UNII:362O9ITL9D)	ACETAMINOPHEN	325 mg	
PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE (UNII: 04JA59TNSJ) (PHENYLEPHRINE - UNII:1WS297W6MV)	PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE	5 mg	

Inactive Ingredients	
Ingredient Name	Strength
POVIDONE (UNII: FZ989GH94E)	
SILICON DIOXIDE (UNII: ETJ7Z6XBU4)	
MALTODEXTRIN (UNII: 7CVR7L4A2D)	
STARCH, CORN (UNII: O8232NY3SJ)	
MAGNESIUM STEARATE (UNII: 70097M6130)	
SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A POTATO (UNII: 5856J3G2A2)	
TITANIUM DIOXIDE (UNII: 15FIX9V2JP)	
STEARIC ACID (UNII: 4ELV7Z65AP)	

MICROCRYSTALLINE CELLULOSE (UNII: OP1R32D61U)	
TALC (UNII: 7SEV7J4R1U)	
POLYVINYL ALCOHOL, UNSPECIFIED (UNII: 532B59J990)	
CROSPROVIDONE (UNII: 2S7830E561)	
FD&C YELLOW NO. 6 (UNII: H77VEI93A8)	
POLYETHYLENE GLYCOL, UNSPECIFIED (UNII: 3WJQ05DW1A)	

Product Characteristics

Color	orange	Score	no score
Shape	CAPSULE (Caplet)	Size	17mm
Flavor		Imprint Code	44;546
Contains			

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:47682-047-80	40 in 1 BOX	09/26/2022	
1	NDC:47682-047-99	2 in 1 PACKET; Type 0: Not a Combination Product		
2	NDC:47682-047-47	100 in 1 BOX	09/26/2022	
2	NDC:47682-047-99	2 in 1 PACKET; Type 0: Not a Combination Product		
3	NDC:47682-047-99	2 in 1 PACKET; Type 0: Not a Combination Product	09/26/2022	

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC Monograph Drug	M012	09/26/2022	

Labeler - Unifirst First Aid Corporation (832947092)

Revised: 9/2025

Unifirst First Aid Corporation