

MAXIBAN 72- narasin and nicarbazin powder
Elanco US Inc.

Elanco™

AF1372

Maxiban™ 72™

(narasin and nicarbazin Type A medicated article)

For Use In Broiler Chicken Feeds Only

Do not feed undiluted.

Active Drug Ingredients:

narasin 36 g per lb

nicarbazin 36 g per lb

For the prevention of coccidiosis in broiler chickens caused by *Eimeria necatrix*, *E. tenella*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. mivati*, and *E. maxima*.

Important: Must be thoroughly mixed into feeds before use.

Mixing Directions: (Broiler Chickens):

Thoroughly mix the following amounts of Maxiban 72 in one ton of complete feed to provide from 27 to 45 grams per ton each of narasin and nicarbazin. The dosage should be adjusted to meet the severity of the coccidial challenge, which varies with environmental and management conditions. A preblend of the Maxiban 72 in 15-20 lbs of feed should be made before incorporating into the total amount of finished feed.

Narasin and Nicarbazin (Grams Per Ton)	Maxiban 72 (Pounds Per Ton of Type C Medicated Feed)
27 Narasin and 27 Nicarbazin	0.75
36 Narasin and 36 Nicarbazin	1.00
45 Narasin and 45 Nicarbazin	1.25

Example of Type B medicated feed - Amounts of Type A medicated article necessary to manufacture one ton of Type B medicated feed. The maximum permitted Type B medicated feed concentration is 11,350 g/ton each of narasin and nicarbazin.

Pounds of Maxiban 72 to Add Per Ton to Make a Type B Medicated Feed	Resulting Narasin and Nicarbazin Concentration in the Type B Medicated Feed	
	g/ton (for each drug)	g/lb (for each drug)

27.56	992.2	0.50
55.12	1,984.3	0.99
110.24	3,968.6	1.98

Feeding Directions:

Feed continuously as the sole ration.

Caution:

Nicarbazin medicated broilers may show reduced heat tolerance if exposed to high temperature and high humidity. Provide adequate drinking water and ventilation during these periods. Do not allow adult turkeys, horses or other equines access to formulations containing narasin. Ingestion of narasin by these species has been fatal. Do not feed to laying hens.

Warning

Withdrawal Period: No withdrawal period is required.

User Safety Warning: When mixing and handling Maxiban 72, use protective clothing, impervious gloves, and a dust mask. Operators should wash thoroughly with soap and water after handling. If accidental eye contact occurs, immediately rinse thoroughly with water. Not for human use.

Adverse Drug Reactions:

To report adverse effects, access medical information, or obtain additional product information, call 1-800-428-4441.

Store at or below 25°C (77°F). Excursions permitted to 37°C (99°F).

Not to be used after the date printed on bag.

Restricted Drug (California) - Use Only as Directed

Approved by the FDA under NADA # 138-952.

Elanco US Inc.

Greenfield, IN 46140, USA

Maxiban, Elanco and the diagonal bar logo are trademarks of Elanco or its affiliates.

TAKE TIME

OBSERVE LABEL DIRECTIONS

Net Weight **25 kg** (55.12 lb)

BG102540X

Elanco™

AF1372

Maxiban™ 72™

(narasina y nicarbazina artículo medicado Tipo A)

Sólo para uso en alimento de Pollos de Engorde

No administrar sin diluir

Principios Activos:

narasina - 36 g per lb (80 g per kg)

nicarbazina - 36 g per lb (80 g per kg)

Para la prevención de coccidiosis en pollos de engorde causada por *Eimeria necatrix*, *E. tenella*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. mivati* y *E. maxima*.

Importante: Debe mezclarse bien con el alimento antes de usarse.

Instrucciones para la mezcla: (Pollos de engorde):

Mézclase completamente las siguientes cantidades de Maxiban 72 en una tonelada de alimento completo para proporcionar de 27 a 45 g/tonelada corta (30 a 50 g/Ton Métrica), tanto de narasina como de nicarbazina. La dosis debe ajustarse de acuerdo con la gravedad del desafío por coccidias, el cual varía según las condiciones ambientales y de manejo.

Se debe realizar una premezcla de Maxiban 72 en 15-20 lb de alimento antes de incorporar al total de alimento terminado.

Narasina + Nicarbazina (Gramos por Tonelada)	Maxiban 72 (Libras por tonelada en el alimento medicado tipo C)
27 Narasina and 27 Nicarbazina	0.75
36 Narasina and 36 Nicarbazina	1.00
45 Narasina and 45 Nicarbazina	1.25

Ejemplo de alimento medicado tipo B: Cantidad de artículo medicado tipo A necesaria para fabricar una tonelada de alimento medicado tipo B. La concentración máxima permitida para el alimento medicado tipo B es de 11,350 g/ton cada una de narasina y nicarbazina.

Libras de Maxiban 72 a añadir por tonelada para preparar alimento medicado de tipo B	Concentración resultante de narasina y nicarbazina en el alimento medicado tipo B	
	g/ton (para cada medicamento)	g/lb (para cada medicamento)
27.56	992.2	0.50

55.12	1,984.3	0.99
110.24	3,968.6	1.98

Instrucciones de uso:

Administre continuamente como ración única.

Precaución:

Los pollos tratados con nicarbazina pueden presentar menor tolerancia al calor si son expuestos a temperaturas y humedad elevadas. Proveer agua de bebida y ventilación adecuadas durante estos períodos. No permita que pavos adultos, caballos u otros equinos tengan acceso a raciones que contengan narasina ya que la ingestión de narasina por parte de estas especies es fatal. No administrar a gallinas de postura.

Advertencia:

Período de retiro: no se requiere ningún período de retiro.

Advertencia de seguridad para el usuario: Deberá usarse ropa protectora, guantes impermeables y mascarilla antipolvo al mezclar o manipular el producto. Los operadores deberán lavarse cuidadosamente con agua y jabón después de manejar el producto. Si se produce contacto accidental con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante. No usar en seres humanos.

Reacciones adversas al fármaco:

Para reportar efectos adversos, obtener información medica o información adicional del producto, llame al 1-800-428-4441.

Conservar a una temperatura igual o menor a 25 °C (77 °F).

Se permiten variaciones hasta 37 °C (99 °F).

No se deberá usar después de la fecha impresa envase.

Medicamento Restringido (California) - Úsese Sólo Como se Indica.

Aprobado por la FDA bajo NADA # 138-952.

Elanco US Inc.

Greenfield, IN 46140, Estados Unidos de América

Maxiban, Elanco y el logo de la barra diagonal son marcas de Elanco o sus afiliadas.

TAKE TIME

OBSERVE LABEL DIRECTIONS

Peso neto: **25 kg** (55.12 lb)

BG102540X

Principal Display Panel - 25 kg Bag Label

Elanco™

AF1372


Maxiban™ 72™

(narasin and nicarbazine Type A medicated article)

For Use In Broiler Chicken Feeds Only

Do not feed undiluted.

Variable Data - No text area



Elanco™ AF1372

Maxiban™ 72™

(narasin and nicarbazine Type A medicated article)

For Use In Broiler Chicken Feeds Only

Do not feed undiluted.

Active Drug Ingredients: narasin 36 g per lb
nicarbazine 36 g per lb

For the prevention of coccidiosis in broiler chickens caused by *Eimeria necatrix*, *E. tenella*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. mivati*, and *E. maxima*.

Important: Must be thoroughly mixed into feeds before use.

Mixing Directions (Broiler Chickens): Thoroughly mix the following amounts of Maxiban 72 in one ton of complete feed to provide from 27 to 45 grams per ton each of narasin and nicarbazine. The dosage should be adjusted to meet the severity of the coccidial challenge, which varies with environmental and management conditions. A preblend of the Maxiban 72 in 15-20 ton of feed should be made before incorporating into the total amount of finished feed.

Narasin and Nicarbazine (Grams Per Ton)	Maxiban 72 (Pounds Per Ton of Type C Medicated Feed)
27 Narasin and 27 Nicarbazine	0.75
36 Narasin and 36 Nicarbazine	1.00
45 Narasin and 45 Nicarbazine	1.25

Example of Type B medicated feed - Amounts of Type A medicated article necessary to manufacture one ton of Type B medicated feed. The maximum permitted Type B medicated feed concentration is 11,350 g/ton each of narasin and nicarbazine.

Pounds of Maxiban 72 to Add Per Ton to Make a Type B Medicated Feed	Resulting Narasin and Nicarbazine Concentration in the Type B Medicated Feed	
	g/ton (for each drug)	g/lb (for each drug)
27.56	992.3	0.50
36.12	1,384.3	0.99
110.24	3,928.6	1.98

Feeding Directions: Feed continuously as the sole ration.

Caution: Nicarbazine medicated broilers may show reduced heat tolerance if exposed to high temperature and high humidity. Provide adequate drinking water and ventilation during these periods. Do not allow adult turkeys, horses or other equines access to formulations containing narasin. Ingestion of narasin by these species has been fatal. Do not feed to laying hens.

Warning

Withdrawal Period: No withdrawal period is required.

User Safety Warning: When mixing and handling Maxiban 72, use protective clothing, impervious gloves, and a dust mask. Operators should wash thoroughly with soap and water after handling. If accidental eye contact occurs, immediately rinse thoroughly with water. Not for human use.

Adverse Drug Reactions: To report adverse effects, access medical information, or obtain additional product information, call 1-800-426-4441.

Show at or below 25°C (77°F). Excursions permitted to 37°C (99°F).

Not to be used after the date printed on bag.

Restricted Drug (California) - Use Only as Directed

Approved by the FDA under NADA # 138-952.

Elanco US Inc.
Greenfield, IN 46140, USA

Maxiban, Elanco and the diagonal bar logo are trademarks of Elanco or its affiliates.

Net Weight 25 kg (55.12 lb)

Print Reads This Way

Elanco™ Maxiban™ 72™

Elanco™

Maxiban™ 72

Print Reads This Way

Elanco™ AF1372

Maxiban™ 72™

(narasina y nicarbazona artículo medicado Tipo A)

Sólo para uso en alimento de Pollos de Engorde

No administrar en diluir

Principios Activos: narasina - 36 g por lb (80 g por kg)
nicarbazona - 36 g por lb (80 g por kg)

Para la prevención de coccidiosis en pollos de engorde causado por *Eimeria necatrix*, *E. tenella*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. mivati* y *E. maxima*.

Importante: Debe mezclarse bien con el alimento antes de usarse.

Instrucciones para la mezcla (Pollos de engorde): Mezclar completamente las siguientes cantidades de Maxiban 72 en una tonelada de alimento completo para proporcionar de 27 a 45 gramos cada uno (50 a 90 g/ton Métrica), tanto de narasina como de nicarbazona. La dosis debe ajustarse de acuerdo con la gravedad del desafío por coccidias, el cual varía según las condiciones ambientales y de manejo.

Se debe realizar una premezcla de Maxiban 72 en 10-20 lb de alimento antes de incorporar al total de alimento terminado.

Narasin + Nicarbazine (Grams Per Ton)	Maxiban 72 (Libras por tonelada en el alimento medicado tipo C)
27 Narasin and 27 Nicarbazine	0.75
36 Narasin and 36 Nicarbazine	1.00
45 Narasin and 45 Nicarbazine	1.25

Example of alimento medicado tipo B: Cantidad de artículo medicado tipo A necesaria para fabricar una tonelada de alimento medicado tipo B. La concentración máxima permitida para el alimento medicado tipo B es de 11,350 g/ton cada uno de narasina y nicarbazona.

Libras de Maxiban 72 a añadir por tonelada para preparar alimento medicado de tipo B	Concentración resultante de narasina y nicarbazona en el alimento medicado tipo B	
	g/ton (para cada medicamento)	g/lb (para cada medicamento)
27.56	992.3	0.50
36.12	1,384.3	0.99
110.24	3,928.6	1.98

Instrucciones de uso: Administrar continuamente como ración única.

Precaución: Los pollos tratados con nicarbazona pueden presentar menor tolerancia al calor y son sensibles a temperatura y humedad elevadas. Proveer agua de bebida y ventilación adecuadas durante estos períodos. No permitir que aves adultas, caballos u otros equinos tengan acceso a raciones que contengan narasina ya que la ingestión de narasina por parte de estas especies es fatal. No administrar a gallinas de postura.

Advertencia:

Periodo de retiro: no se requiere ningún periodo de retiro.

Advertencia de seguridad para el usuario: Debe usarse ropa protectora, guantes impermeables y mascarilla antipolvo al mezclar o manipular el producto. Los operadores deberán lavarse cuidadosamente con agua y jabón después de manejar el producto. Si se produce contacto accidental con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante. No usar en áreas fumadas.

Reacciones adversas al fármaco: Para reportar efectos adversos, obtener información médica o información adicional del producto, llame al 1-800-426-4441.

Conservar a una temperatura igual o menor a 25 °C (77 °F). Se permiten variaciones hasta 37 °C (99 °F).

No se deberá usar después de la fecha impresa envaso.

Medicamento Veterinario (California) - Úsalo Solo Como se Indica.

Aprobado por la FDA bajo NADA # 138-952.

Elanco US Inc.
Greenfield, IN 46140, Estados Unidos de América

Maxiban, Elanco y el logo de la barra diagonal son marcas de Elanco o sus afiliadas.

Peso neto: 25 kg (55.12 lb)

BG102540X

tc + **INDUSTRIAL** **INDUSTRIAL**

VETERINARIO **INDUSTRIAL** **INDUSTRIAL**

APROBADO POR LA FDA **INDUSTRIAL** **INDUSTRIAL**

Registrado en el **INDUSTRIAL** **INDUSTRIAL**

Volumen **INDUSTRIAL** **INDUSTRIAL**

MAXIBAN 72

narasin and nicarbazine powder

Product Information

Product Type	OTC TYPE A MEDICATED ARTICLE ANIMAL DRUG	Item Code (Source)	NDC:58198-1372
Route of Administration	ORAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
narasin (UNII: DZY9VU539P) (narasin - UNII:DZY9VU539P)	narasin	36 g in 0.45 kg
nicarbazin (UNII: 11P9NUA12U) (4,4'-dinitrocarbanilide - UNII:9IDD210E75)	nicarbazin	36 g in 0.45 kg

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:58198-1372-1	25 kg in 1 BAG		

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
NADA	NADA138952	02/11/2010	

Labeler - Elanco US Inc. (966985624)

Revised: 4/2024

Elanco US Inc.